

شانت مغزی

در صورتیکه علامت بیماری هیدروسفالی ناشی از عملکرد مغز در ممانعت از جریان مایع مغزی - نخاعی باشد، ممکن است با عمل جراحی بر طرف شود.

علت بیماری هیدروسفالی کودک شما توسط جراح مشاور برایتان توضیح داده خواهد شد.

به منظور جلوگیری از تشکیل بیشتر مایع مغزی نخاعی، لازم است با انجام عمل جراحی، شانت بطنی صفاقی در بدن کودک تعبیه می شود. شانت بطنی صفاقی وسیله ای متشکل از لوله و دریچه است. زمانیکه فشار اضافی در مغز ایجاد شود، دریچه باز می شود، مایع اضافی، بدون خطر از طریق لوله های کنار گوش، تخلیه می شود، به سمت گردن و سینه سرازیر شده و سپس وارد حفره شکمی می شود و در آنجا بدون خطر جذب می شود. این شیوه، تنها راه رهایی از تشکیل مایع مغزی نخاعی اضافی است.

برخی از شانت ها را میتوان برای تخلیه بیشتر یا کمتر مایع، از بیرون بدن برنامه ریزی کرد. جراح به شما خواهد گفت که کدام وسیله برای درمان کودک شما، بهترین است.



اقدامات مقدماتی تشخیصی مورد نیاز چیست؟

- معاینه کامل توسط جراح
- آزمایشات
- در صورت نیاز نوار قلب و عکس قفسه سینه نیز انجام می شود.

اقدامات قبل از عمل چیست؟

قبل از عملتان، خوردن و نوشیدن را کنار بگذارید. ولی می توانید داروهای متداول تان را مصرف کنید، مگر آنکه موارد دیگری توصیه شده باشد.

قبل از عمل مقدار کمی از موی سر کودک تان تراشیده می شود.

در اتاق عمل پس از بیهوشی و شستشوی ناحیه عمل، جراح سوراخی در جمجمه ایجاد و شکاف کوچکی نیز در شکم ایجاد می کند. سپس لوله ای را وارد مغز کرده و شانت را به آن وصل می کند و بعد زخم ها را می بندد.

بعد از عمل جراحی چه اتفاقی می افتد؟

ممکن است بیمار بعد از عمل نیاز به مراقبت در بخش ویژه داشته باشد. در غیر اینصورت به بخش منتقل شده و تحت مراقبت پرستاری قرار می گیرید. تا زمانیکه بیمار کاملاً از حالت بیهوشی خارج شود. که معمولاً چند ساعت بعد از عمل خواهد بود،



ماسک اکسیژن به کودک وصل است. شاید لازم باشد به مدت ۲۴ ساعت به صورت دمر بخوابد.

اما بلافاصله بعد از دستور جراح، ترغیب به حرکت می شوید.

از آنجائیکه معمولاً درد در ناحیه زخم وجود دارد به کودک مسکن داده خواهد شد.

کودک دو جای زخم خواهید داشت؛ یکی بر روی شکم و دیگری بر روی سر.

معمولاً بخیه های زخم سر ۵ روز بعد جراحی و بخیه های زخم شکم ۷ روز بعد از جراحی برداشته می شوند.

اگر قبل برداشتن بخیه ها از بیمارستان مرخص شوید، پزشک و پرستار در روز ترخیص زمان و مکان برداشتن بخیه ها از روی زخم را به کودک خواهند گفت.





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء

راهنمای بیمار

شانت مغزی

کد محتوا: ۵۶۲




<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

- اگر در زمان استراحت در خانه با هر یک از موارد زیر مواجه شدید حتماً با پزشکتان تماس بگیرید:
- ⊙ تب (که ممکن است نشانه عفونت باشد).
- ⊙ غش و تشنج
- ⊙ سردردهای شدید (نشانه افزایش فشار در مغز)
- ⊙ استفراغ مکرر(نشانه افزایش فشار در مغز)کسالت خواب آلودگی
- ⊙ تورم یا خارج شدن مایع از محل زخم



منابع: درسنامه پرستاری کودکان (وونگ), ویرایش ۲۰۱۵
تهیه کننده: مریم همتی "کارشناس پرستاری"
مشاور علمی: دکتر نیروانا توامن "متخصص کودکان و نوزادان"
طراحی و تدوین: "اقتداری کارشناس ارشد پرستاری"
 دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) دی ماه ۱۳۹۸ (بروزرسانی مرداد ۱۳۹۹)



احساس کودک در مدت بهبودی

- ⊕ ممکن است احساس خستگی و اضطراب داشته باشد. این حالت عادی است.
- ⊕ استراحت در طول روز به وی کمک می کند. داشتن سرده، حالتی عادی است.
- ⊕ در زمان رفتن به خانه به بیمار مسکن داده خواهد شد.
- ⊕ هر زمان که کودک احساس آمادگی کرد به تدریج میزان فعالیت فیزیکی اش را افزایش دهد.



علائم هشدار

جلوگیری از آمدن فشار به درجه شانت، و خوابیدن روی سمت سالم.

