



کدمحتوا ۶۶۹ اعلام خطر عمومی که مادران باید توجه کنند:



- تب زیر زبانی بیشتر از ۳۹/۵ درجه برای ۲ تا ۳ نوبت
- تب زیر بغل بیشتر از ۳۹ درجه برای ۲ تا ۳ نوبت
- تب زیرزبانی بین ۳۸ تا ۳۹/۵ درجه برای بیش از ۲ تا ۳ روز
- تب زیر بغل بین ۳۷/۵ تا ۳۹ درجه برای بیش از ۲ تا ۳ روز
- ادامه تب برای بیش از ۴۸ ساعت از شروع آنتی بیوتیک
- شلی بدن و بی حالی شدید
- بی توجهی نسبت به اتفاقات اطراف - بی قراری زیاد
- خواب آلودگی (کودک خواب است و وقتی بیدار می کنید نمی تواند بیدار باقی بماند)
- استفراغ مکرر یا استفراغ سبز یا استفراغ جهنده
- عدم توانائی نوشیدن مایعات و عدم توانائی شیر خوردن (در کودکان شیرخوار)
- خر خر کردن شدید
- گریه های غیرطبیعی (گریه ضعیف یا گریه بسیار بلند و جیغ مانند)
- سردرد شدید
- تنفس تند (بیشتر از ۴۰ مرتبه در دقیقه) و تنفس سخت
- کبودی لبها، زبان، ناخن ها و یا دور چشم ها
- صدای سوت مانند در هنگام نفس کشیدن (خس خس)
- افت اکسیژن کمتر از ۹۳ درصد
- رنگ پریدگی، خاکستری شدن رنگ پوست یا شبکه ای شدن پوست
- دانه های سر سوزنی زیر پوستی به رنگ قرمز یا بنفش
- دانه های قرمز روی پوست، کهیر
- قرمزی چشم ها، لبها یا زبان یا مخاط دهان یا کف دست و پا
- کم شدن ادرار ادرار بدبو، بد رنگ، بی قراری موقع ادرار کردن
- سردی دست و پاها در زمانهایی که کودک تب ندارد
- دل درد شدید - اسهال خونی یا بلغمی