


آنوریسم مغزی چیست؟

آنوریسم مغزی یک برآمدگی و تورم در دیواره یکی از شریانهای مغز شبیه به بادکنک کوچک میباشد که در اثر نقص و ضعف در دیواره شریان رخ میدهد. آنوریسم ممکن است به آرامی بزرگ شده و پاره شود و باعث خونریزی مغزی شود.



دلایل آنوریسم

- دلیل روشنی برای ابتلا به آنوریسم مشخص نشده است. برخی از نظرات درباره علل بروز عبارتند از:
- نقص یا ضعف مادرزادی در دیواره عروق مغز
 - فشار خون بالا
 - ضربه یا آسیب به دیواره عروق
 - عفونت مغزی

انواع آنوریسم



- کیسه ای
- دوکی

انواع آنوریسم



راههای تشخیص آنوریسم و خونریزی زیر عنکبوتیه

- سابقه و معاینه فیزیکی بیمار
- سی تی اسکن مغز
- گرفتن مایع مغزی نخاعی و دیدن خون در آن
- سی تی آنژیوگرافی
- ام آر آی مغز
- آنژیوگرافی عروق مغزی

درمان آنوریسم


- یکی از اهداف اولیه درمان، ترمیم آنوریسم برای پیشگیری از خونریزی میباشد.
- زمان و نوع درمان به محل، اندازه آنوریسم و شرایط بالینی بیمار وابسته است.

انواع درمان

- جراحی
- مداخله داخل عروقی
- دارویی


جراحی

- ◆ قرار دادن کلیپس روی گردن آنوریسم
- ◆ پوشش دادن دیواره آنوریسم با بافت عضلانی برای پیشگیری از خونریزی
- ◆ پوشاندن دیواره آنوریسم بامواد خود سخت شونده



درمان داخل عروقی

- ❖ فرستادن یک لوله پلاستیکی (کاتتر) از شریان پا به داخل آنوریسم:
- کوپلینگ: گذاشتن قطعه فنری و حلقوی در داخل آنوریسم
- استنت: گذاشتن شبکه توری در آنوریسم



درمان دارویی

- کنترل فشار خون
- تزریق مایعات داخل وریدی
- کنترل درد

مراقبت قبل از عمل جراحی

- بستری بیمار در بخش مراقبتهای ویژه
- کنترل دقیق فشار خون
- کنترل درد بیمار
- کاهش نور اتاق بیمار
- خودداری از فعالیت شدید
- تغذیه مناسب و استفاده از مواد نرم کننده مدفوع
- انجام آزمایشات لازم



یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

آنوریسم مغزی

(نازک شدن دیواره عروق مغز)

کد محتوا: ۴۱۰



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

علامه آنوریسم

قبل از پاره شدن:

سردرد، چشم درد، تاری دید، دوبینی

بعد از پاره شدن:

- سردرد شدید تغییر در سطح هوشیاری، تشنج، استفراغ و اشکال در صحبت کردن و راه رفتن
- آنوریسم پاره شده باعث خونریزی در یک یا چند جای مغز می شود از جمله:
- خونریزی زیر عنکبوتیه و خونریزی داخل مغزی
- خونریزی داخل بطنی (فضای بطنها ی مغز پر از خون و مایع مغز)



پدید آورنده: حسن حبیب اللهی "کارشناس پرستاری"

منبع: <https://patienteducation.osumc.edu>

پرستاری داخلی جراحی پروتر سوارث ۲۰۱۸

مشاور علمی: دکتر همایون تابش "متخصص جراحی اعصاب و ستون فقرات"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت" زمستان ۱۳۹۲

بروزرسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) خرداد ۱۳۹۹



مراقبت بعد از عمل جراحی

- کنترل فشار خون و فشار داخل مغزی
- کنترل تب و کنترل درد
- مایعات داخل وریدی
- دارو درمانی
- تغذیه مناسب
- شروع فعالیت به تدریج

بهبودی

زمان بهبودی بسته به این که آنوریسم پاره شده است یا نه متفاوت میباشد.
در آنوریسم پاره شده با توجه به مشکلات بوجود آمده ممکن است بستری طولانی در بیمارستان و باز توانی نیاز باشد.

عوارض آنوریسم مغزی پاره شده

- خونریزی مجدد
- انقباض عروق مغزی: تنگ شدن عروق نزدیک آنوریسم و کاهش خونرسانی به قسمتی از مغز
- هیدروسفالی: مسدود شدن جریان مایع مغزی نخاعی در اثر خونریزی و تجمع آن در مغز همراه با افزایش فشار داخل جمجمه.
- تشنج
- ضعف شناختی: تغییر در حالات روحی و رفتار

