

شا يعتر ين عوارض

سر گيجه - خوا ب آلود گي - بي قراری تهوع و استفراغ

از عوارض ديگر :

كا هش گلبو ل سفيد و كا هش پلا كت بد ن .قلبي



مراقبتهای قبل از شروع در مان

اندازه گيرى و شما راش گلبولهای سفيد
و قرمز خون.

اندازه گيرى عملکرد کبد و کلیه آز ما يش ادرار
اندازه گيرى سطح اهن .چك گلبو لهاو آهن در دو ماه
اول هر ماه و سپس سالی يکبار

اندازه گيرى تستهای کبدی و در صورت بروز اختلال
کبدی لازم است دارو قطع شود
معاینه چشم و نوار قلب

مراقبتهای حين درمان

اگر سرگيجه و علايم گوا رشى پس از چند روز
قطع نشد با پزشك خود مشورت کنيد .

تما خل داروي

كل عوارض مغزى کا ربا ما ز پين را تشد يد مى
کند .

فوبيار بيتا ل و فني توئين غلضت سرمى اين
دارو را کا هش مى دهد و تشنج بيمار كنترل نميشود.

والپرا ت سد يم غلضت ان را در خون با لا مى برد
قرص لا مو تريئن غلضت ان را با لا مى برد .

استا زو لا ميد با تو ليد ا درا ر بيشتر سطح دارو را
در خون با لا مى برد و با عث کا هش سد يم خون
مى شود .

سايميدین و دا نا زول و ديلتيا زيم سطح کا ربا ما
زپين را با لا برده و مسمو ميت ميدهد .

استا مينو فن با ان مسمو ميت کبدی مى دهد .
فلوكسيتين اثر ان را ز ياد مى کند و مسمو ميت
ميدهد .

کا ربا ما زپين اثر ايمى پرا مين و امي تريپتيلين را
كا هش مى دهد .



كاربامازپين چيست؟

گروه دارويي : ضد درد_ ضد تشنج

شكل دارو : قرص ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميلى گرم

روش جذب : ازدستگاه گوارش جذب ميشود. در کبد
تجزие مى شود. ۷۰ درصد از راه ادرارو ۳۰ درصد راه



موارد مصرف

تشنج. اختلالات دو قطبی(افسردگی - شیدایی) - دیا
بت بی مزه ، سکسکه مقاوم ، اسکیزو فرنيا و پیش فعالی

مواردی که مصرف آن ممنوع است

در افرادی که نا رسا بی مغز استخوان دارند .

در افرادی که حساسیت به امی تريپتيلین یا ایمی پیرامین دارند .

افرادی که مشکل قلبی دارند .

در افرادی که فشار داخل چشم آنها بالا است .

یامن اسمه دواء و ذکر و شفاء



راهنمای بیمار

قرص کاربا مازپین

کد محتوا: ۵۱۱



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

شرادط نگهداری

- در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتگراد و در جای خشک نگهداری کنید
- در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر با پزشک مشورت کنید: قرص لاموتريژن، استاتازولامید، والپرات سدیم، سایمتدین، دانازول، استامینوفن، این داروها ممکن است اثر کارباماژپین را تقویت کنند.

در موقع مصرف دارو به علت خوا ب آلوودگی و تاری دید
باید از راندگی و انجام کارهای دقیق خوداری کنید.

این دارو را ناگهان قطع نکنید
چون باعث تشنج مداوم می شود

توصیه به خانواده ها

- در موقع مصرف دارو به علت خوا ب آلوودگی و تاری دید
باید از راندگی و انجام کارهای دقیق خوداری کنید.
- جهت کاهش ناراحتی گوارشی افزایش جذب، دارو را با غذا مصرف کنید.
- جهت ثابت ماندن سطح دارو در خون باید آن را در زمان معینی مصرف کنید.
- از قرار گرفتن در زیر نور مستقیم آفتاب خوداری کنید و از لباس محافظ (کلاه و عینک) (وکرم ضد آفتاب استفاده کنید).

در صورت بروز علائم زیر به پزشک
مراجعةه کنید

- تب و گلو درد
- زخم‌های دهانی - کبود شدگی یا خونریزی آسان
- تکرار - احتباس ادراری - کاهش میزان ادرار -
- ناتوانی جنسی - علائم بیماری قلبی مثل تورم و تنگی نفس وسیاه شدن ناخنها ولبها