

کلروپرومازین چیست؟

- ✦ کلروپرومازین به شکل قرصهای ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی موجود می باشد.
- ✦ کلروپرومازین در اختلالات روانی نظیر جنون جوانی، افزایش خلق و نیز بصورت داروی کمکی در درمان هیجان های بالا و نیز بعنوان ضد تهوع و درمان سکسکه شدید بکار می رود.
- ✦ این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود، و سپس از راه ادرار و صفرا دفع می شود.



مقدار مصرف

- 🌍 در بزرگسالان ابتدا به میزان ۲۵ میلی گرم در روز و برحسب پاسخ دهی بیمار مصرف می شود سپس باتوجه به سن و وضعیت بیمار و صلاح دید پزشک بتدریج افزایش می یابد.
- 🌍 در افراد مسن یا ضعیف و افراد ۶-۱۲ سال به میزان نصف تا یک سوم میزان مصرف در بزرگسالان مصرف می شود.



تداخلات دارویی

قرص کلروپرومازین با برخی از داروهای قلبی و داروهای کاهنده فشارخون و دیگر داروهای روانپزشکی تداخل دارد بنابراین به هر پزشکی که مراجعه می کنید حتما ذکر کنید که این دارو را مصرف می کنید .

مصرف در دوران حاملگی و شیردهی

مصرف مقدار کم آن برای مادر و جنین بی خطر است اما مصرف در اواخر حاملگی و حین زایمان می تواند سبب عوارض جانبی در نوزاد شود پس در حاملگی در مورد ادامه مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

کلروپرومازین می تواند در شیر مادر نفوذ کند و به نوزاد آسیب بزند، پس اگر در حال شیردهی هستید، قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع سازید.

عوارض جانبی

- ✦ در شروع درمان شایعترین عارضه خواب آلودگی است.
- ✦ سایر عوارض شامل موارد زیر می باشد:
- ✦ خواب آلودگی روز بعد از مصرف
- ✦ گیجی و عدم تعادل (بخصوص در افراد مسن)



✦ تحریک پذیری و در برخی موارد سردرد و سرگیجه

✦ در ناحیه شکم.

✦ افت فشار خون

✦ افزایش ترشحات بزاق، دل دردهای گاه گاهی شکم و درد

مسمومیت با مقدارهای بیش از اندازه دارو

اگر شما فکر می کنید مقدار زیادی از دارو را در یک نوبت زمانی مصرف کرده اید حتما به اورژانس مراجعه کنید.

نشانه های مصرف بیش از حد دارو عبارتند از: خشکی دهان، یبوست، ورم کردن یا درد در ناحیه شکم، احساس بیقراری، تب، حملات صرع، سفتی عضلات، تغییر در ضربان قلب، خواب آلودگی شدید، ضعف.

فراموش کردن نوبت مصرفی

سریع مقدار فراموش شده را پس از به یاد آوردن مصرف کنید.

✦ اگر زمان یادشده نزدیک به زمان دوز بعدی دارو بود، دوز

قبل را استفاده نکرده و مقدارجدید را طبق جدول زمانبندی شده مصرف نمایید.

✦ هیچ گاه مقدار زیادی از دارو را برای جبران نوبت فراموش

شده استفاده نکنید و دراین موارد حتما با پزشک خود

صحبت کنید.





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

قرص

کلروپرومازین

کد محتوا : ۵۱۲



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

■ بعد از یک دوره طولانی از مصرف کلروپرومازین هرگز به صورت خودسرانه و ناگهانی دارو را قطع نکنید چون ممکن است شما دچار عوارض ترک این دارو مثل: تهوع، استفراغ، گیجی، احساس ضعف شوید. با پزشک خود در مورد این که چگونه می توان از عوارض ترک این دارو جلوگیری کرد صحبت کنید.

■ کلروپرومازین می تواند سبب عوارض جانبی چون کاهش تمرکز شود، پس در زمان رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به بیداری و هوشیاری کامل دارد مراقب باشید.

■ از تغییر وضعیت ناگهانی مثل سریع نشستن یا بلند شدن و یا از حالت خوابیده بلند شدن جلوگیری کنید چون ممکن است احساس سرگیجه

■ از قرار گرفتن در نور خورشید اجتناب کنید، چون کلروپرومازین پوست شما را نسبت به نور خورشید بسیار حساس می کند و آفتاب سوختگی رخ می دهد. برای جلوگیری از آفتاب سوختگی لباسهای پوشیده و محافظ در برابر نور خورشید، کلاه و عینک و کرم های ضدآفتاب استفاده کنید. .

تهیه کننده : زهرا قائدی "پرستار"

منبع: فارماکولوژی بالینی پرستاری ۲۰۲۰

مشاور علمی: فرشته شکیبایی " فوق تخصص روانپزشکی

کودکان و نوجوانان "

طراحی و تدوین : مریم اقتداری "کارشناس آموزش سلامت"

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) شهریور ۱۳۹۹



توصیه های مهم هنگام مصرف

■ برای حصول اثرات درمانی مطلوب ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.

■ قبل از قطع مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.

■ در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی یا درمان اورژانس، پزشک باید از مصرف این دارو آگاه گردد.

■ این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو هفته ، باید به پزشک مراجعه نمود.

■ مصرف این دارو باعث می شود که نتیجه بعضی از آزمایشات شما غیرطبیعی باشد، پس پزشک خود را در مورد مصرف کلروپرومازین مطلع سازید.

■ اگر شما نیازمند به اسکن با رادیو گرافی یا (ام.آر.آی) MRI از ستون فقرات خود هستید قبل از مصرف کلروپرومازین پزشک خود را مطلع سازید. شما ممکن است نیازمند به قطع دارو برای مدت کوتاهی باشید

• **دوره درمان با این دارو باید کامل شود. این دارو نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف کنید.**

■ به صورت آرام و ملایم حرکات خود را انجام دهید تا از افتادن جلوگیری شود. بطور مثال برای تغییر وضعیت از حالت خوابیده به ایستاده اول زمانی را برای نشستن قرار داده سپس بایستید

