

کپسول فلوکستین

فلوکستین از داروهای ضد افسردگی است

- برای درمان افسردگی
 - اختلال وسواس جبری
 - بعضی از اختلالات خوردن
 - اختلال ترس و سندرم پیش از قاعدگی
- استفاده می شود.

فلوکستین به شکل کپسول های ۲۰ و ۱۰ میلی گرمی و شربت موجود می باشد.
این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود
و حدود ۴۸-۲۱۶ ساعت اثر آن باقی می ماند.



مقدار مصرف فلوکستین

مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود
ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می
باشد:


- در بزرگسالان ابتدا مقدار ۲۰ میلی گرم در هنگام صبح و سپس در دو نوبت صبح و عصر ۲۰ میلی گرم مصرف می شود.
- در کودکان ۸-۱۸ سال فقط برای درمان افسردگی ابتدا ۱۰ میلی گرم در روز و پس از یک هفته ۲۰ میلی گرم در روز مصرف می شود.



تداخلات دارویی

مصرف همزمان داروهای زیر اثر فلوکستین را مختل کرده یا باعث افزایش عوارض آن شده و یا باعث تشدید اثرات سمیت داروی مصرفی می شود:

وارفارین، داروهای ضد صرع، کاربامازپین، سیپروهیتادین، سوماترپتان، دیازپام، بنزودیازپین، هالوپریدول، پروپرانولول، متوپرولول، دکسترومتورفان، تیرپتوفان.



در موارد زیر دارو را با نظر پزشک استفاده کنید:

- نارسایی شدید کبد و کلیوی، صرع و تشنج کنترل نشده، بی اشتهایی
- اگر شما مبتلا به دیابت هستید، فلوکستین ممکن است بر روی سطح قندخون شما تاثیر بگذارد، به همین دلیل سطح قندخون خود را هنگام مصرف دارو به طور منظم کنترل نمایید و نتیجه آنها را با پزشکتان در میان گذارید.
- پس پزشک خود را در مورد هرگونه بیماری جسمی و داروی مصرفی مطلع سازید.



عوارض جانبی دارو:

علائم زیر ممکن است رخ دهند ولی فقط در صورتی که مشکل ساز شدند نیاز است با پزشک در میان گذاشته شوند:

- اضطراب، تشویش، که گاه در چند روز اول تشدید می شود.
- خواب آلودگی، خشکی دهان، تهوع، اسهال، ضربان قلب تند یا نامنظم،
- افزایش تعریق، مشکل در به خواب رفتن، احساس گرما یا حرارت، برافروختگی یا قرمزی پوست
- افزایش اشتها، دل پیچه، شکم درد یا نفخ، مشکلات قاعدگی.
- علائم افت قندخون (اضطراب، گیجی، خواب آلودگی، عرق سرد، تپش قلب، لرزش بدن، ضعف یا خستگی غیرعادی، سردرد)
- در صورتی که بارداری، شیردهی، یا قصد حامله شدن دارید با پزشک خود مشورت کنید.
- گاهی مصرف آن بلا مانع است.





یا من اسم دواء و ذکره شفاء

راهنمای بیمار

کپسول فلوکستین

کد محتوا: ۵۱۵



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

- برای جلوگیری از ناراحتی معده می‌توان آن را با غذا خورد.
- فلوکستین را دور از دسترس کودکان، و دور از گرما، نور مستقیم و حرارت مرطوب نگهداری کنید (در این شرایط فلوکستین فاسد می‌شود).
- هیچ گاه دارو را خودسرانه قطع نکنید.
- اگر یک نوبت را فراموش کردید، در صورتی که ظرف یک ساعت آن را به یاد آورید بلافاصله مصرف کنید؛ در غیر اینصورت نوبت فراموش شده را رها کرده، به برنامه دارویی معمولتان بازگردید، مقدار دارو را دوبرابر نکنید.

در صورت نیاز اورژانسی به کلینیک نور با شماره

۳۲۲۴۱۵۱۶ مراجعه کنید

تهیه و تنظیم: نا هید زما نی " کارشناس پرستاری "
 منبع: فارماکولوژی بالینی پرستاری ۲۰۲۰
 مشاوره علمی: دکتر فرشته شکیبایی فوق تخصص روانپزشکی
 کودک و نوجوان
 طراحی و تدوین: مریم اقتداری "کارشناس آموزش سلامت "
 تابستان ۱۳۹۴
 بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) شهریور ۱۳۹۹



توصیه:

- به طور منظم به پزشکتان مراجعه کنید تا بهبودیتان را زیر نظر داشته‌باشد.
- ممکن است ۴ هفته طول بکشد تا اثر دارو ظاهر شود و به حداکثر برسد
- تا مشخص شدن پاسخ بدنتان به این دارو، هنگام رانندگی یا کار با وسایل خطرناک احتیاط کنید.
- این دارو در برخی افراد موجب خواب‌آلودگی و کاهش سطح هوشیاری می‌شود.
- یک برگ شناسایی پزشکی که نشان‌دهد فلوکستین مصرف می‌کنید، همراه داشته باشید.

مهم نیست چند بار زمین خورده اید
 مهم این است که چند بار از زمین بلند
 می شوید

