

## موارد مصرف قرص ریواروکسابان

قرص ریواروکسیبان به شکل قرص های ۱۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرمی وجود دارد

ریواروکسابان در درمان عوارض بیماری های زیر مؤثر شناخته شده و علاوه بر این می تواند موجب جلوگیری از بروز مجدد این موارد شود.

در فیبریلاسیون دهلیزی (یک نوع از ضربان نامنظم قلب)، بخشی از قلب به صورت طبیعی تپش ندارد؛ این امر می تواند موجب تشکیل لخته شده و با حرکت این لخته به بخش های مختلف بدن مانند مغز موجب سکتة مغزی می گردد.

ریواروکسابان همچنین با جلوگیری از تشکیل لخته خون احتمال وقوع سکتة قلبی را کاهش می دهد.

با قطع مصرف ریواروکسابان، احتمال تشکیل لخته در عروق زیاد می شود.

DVT (دی وی تی) لخته خونی است که در سیاهرگ های عمقی بدن، خصوصاً در سیاهرگ های پا ایجاد می شود. بروز DVT یک وضعیت خطرناک است و می تواند منجر به آمبولی ریوی شود. آمبولی ریوی لخته خونی است که در قسمت دیگری از بدن ایجاد شده با کمک جریان خون به ریه آمده و ممکن است باعث قطع جریان خون وریدی شده و بیمار در خطر مرگ قرار بگیرد.

جلوگیری از ایجاد DVT پس از جراحی جایگزین مفاصل زانو و لگن

از آنجا که ریواروکسابان یک داروی رقیق کننده خون می باشد و برای جلوگیری از تشکیل لخته خون مصرف می شود، پس در زمان مصرف آن امکان دارد به راحتی بدنتان کبود شده و یا برای بند آمدن خونریزی، زمان بیشتری نیاز باشد. احتمال بروز خونریزی بطور جدی وجود دارد.

در صورت مصرف همزمان ریواروکسابان با داروی دیگری که آن هم احتمال خونریزی را بالا می برد، شما بیشتر در معرض خطر بروز خونریزی هستید. این داروها شامل:

آسپرین یا محصولات حاوی این دارو به صورت ترکیبی داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن و دیکلوفناک، وارفارین، داروهای حاوی هپارین، کلوییدوگرل، سرتالین، فلوکستین، سیتالوپرام، ونلافاکسین و دولوکستین

**در صورت مصرف هر یک از داروهای ذکر شده به پزشکتان اطلاع دهید.**

**در صورت بروز هر یک از این علائم و نشانه های خونریزی، سریعاً به اورژانس مراجعه کرده یا با پزشک خود تماس بگیرید:**

- هر خونریزی غیر مترقبه و یا خونریزی که زمان زیادی طول بکشد مانند:
  ۱. خونریزی غیر عادی از لثه ها
  ۲. خونریزی قاعدگی که شدتش بیشتر از حد عادی باشد یا خونریزی واژینال غیرعادی
  ۳. خونریزی مکرر از بینی
- ادرار قرمز، صورتی یا قهوه ای
- مدفوع قرمز روشن یا سیاه (مانند قیر)
- سرفه حاوی خون و یا لخته خون
- استفراغ خونی و یا استفراغی که حاوی دانه های قهوه مانند باشد
- سردرد، گیجی و یا ضعف
- درد، تورم و یا خونریزی جدید در محل زخم قبلی

**قبل از مصرف داروی ریواروکسابان چه مواردی را باید به پزشک خود اطلاع دهید؟**

وجود مشکلات خونی  
وجود مشکلات کلیوی و یا کبدی  
وجود هر مشکل پزشکی دیگر  
در صورت بارداری یا تصمیم برای بارداری حین مصرف ریواروکسابان سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

اینکه ریواروکسابان می تواند به جنین متولد نشده شما آسیب برساند یا نه . هنوز مشخص نیست.

چنانچه با دستور پزشک در دوره بارداری، ریواروکسابان مصرف می کنید، در صورت بروز خونریزی یا نشانه های از دست دادن خون، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

از تمامی داروهای مصرفی خود، چه نسخه ای و چه غیرنسخه ای، ویتامین ها و داروهای گیاهی، فهرستی تهیه کرده و به پزشکتان اطلاع دهید.

بعضی داروها ممکن است روی چگونگی عملکرد ریواروکسابان تأثیر بگذارند. بعضی داروها می توانند احتمال خونریزی را افزایش دهند یا اثر این دارو را کم کنند. مانند کتوکونازول، فنوباربیتال، علف چای، فنی توئین، ریفامپین، کاربامازپین، پریمیدون، کلاریترومایسین





یاسن اسمه دواء و ذکره شفاء



راهنمای بیمار

## قرص ریواروکسابان را

چگونه مصرف کنم؟

کد محتوا: ۵۷۰

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

✚ مصرف هیچ داروی جدیدی را بدون مشورت با پزشکتان آغاز نکنید، حتی در مصرف کوتاه مدت مسکن های بدون نسخه نیز با پزشکتان مشورت کنید.

✚ پزشکتان ممکن است به صورت موقت این دارو را قبل از هر جراحی یا رویه پزشکی و یا دندان پزشکی قطع کند. پزشک به شما می گوید چه مدت پس از عمل می توانید دوباره ریواروکسابان را مصرف کنید.

✚ در صورت مشکل در بلع قرص، با پزشک یا داروساز خود در مورد راه های دیگر برای مصرف این دارو صحبت کنید.

✚ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید.

✚ در صورت مصرف بیش از حد ریواروکسابان به اورژانس رفته و یا سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید



تهیه کننده: اکرم یزدانی "کارشناس پرستاری"

منبع: فارماکولوژی بالینی پرستاری ۲۰۲۰

مشاور علمی: دکتر رسول سلطانی "متخصص فارماکو تراپی"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) شهرپور

۱۳۹۹



✓ ریواروکسابان را یک بار در روز در هنگام وعده غذای عصر مصرف کنید.

✓ ریواروکسابان را بر اساس تجویز پزشک یک یا دو بار در روز مصرف نمایید.

✓ ریواروکسابان را همراه با غذا در یک ساعت مشخص در روز میل نمایید.

• اگر دو بار در روز ریواروکسابان مصرف می کنید: به محض به یاد آوردن در همان روز آن قرص را مصرف کنید. شما می توانید برای جبران، دو وعده را به صورت هم زمان مصرف کنید. وعده بعدی را طبق زمان بندی قبلی میل نمایید.

• اگر یک بار در روز ریواروکسابان مصرف می کنید: به محض به یاد آوردن در همان روز آن قرص را مصرف کنید. وعده بعدی را طبق زمان بندی قبلی میل نمایید.

• قبل از اتمام دارو نسبت به تهیه دوباره آن اقدام نمایید.

### توصیه های مهم برای بیمار

✚ ریواروکسابان را فقط برای موردی که توسط پزشک تجویز شده است استفاده نمایید.

✚ از توصیه ی دارو به دیگران حتی در صورت ابتلا به بیماری مشابه، خودداری کنید؛ این کار می تواند به آن ها صدمه بزند.

✚ این دارو را بدون مشورت با پزشک قطع ننمایید؛ مصرف نکردن دارو برابر است با امکان بروز لخته خون.

✚ قطع این دارو احتمال بروز سکتة قلبی و مغزی را افزایش می دهد.

✚ اگر مجبور به قطع این دارو باشید، ممکن است پزشک شما داروی رقیق کننده خون دیگری برایتان تجویز نماید.

✚ مدت زمان مصرف این دارو را پزشک تان مشخص می کند. بدون اطلاع پزشک داروی خود را قطع ننمایید.

