

سولفات منیزیم در بارداری

سولفات منیزیم دارویی است که براساس شرایط و نیاز شما، تجویز می شود.

این شرایط شامل موارد زیر می باشد:

کنترل فشارخون مادر و پیشگیری از وقوع حملات تشنجی

در مادرانی که فشارخون بالا و دفع پروتئین در ادرار دارند.

پیشگیری از زایمان زودرس

حفاظت عصبی در نوزاد

این دارو باعث کنترل فشار خون و در اغلب موارد باعث بهبود انقباضات زودرس زایمانی میشود. اما میزان و مدت زمان اثر آن، نسبت به هر زن باردار متفاوت میباشد.

در موارد فشارخون بالا، داروی سولفات منیزیم می تواند باعث جلوگیری از تشنج ناشی از فشارخون بالا شود.



همچنین در اغلب موارد باعث به تاخیر انداختن زایمان زودرس تا چندین روز می شود و تاثیر بسزایی در روند رشد جنینی دارد.

آیا سولفات منیزیم بر بارداری و جنین تاثیر

دارد؟

داروی سولفات منیزیم نیز مانند سایر داروها، اگر میزان آن بیش از حد و خودسرانه مصرف شود، تاثیرات جانبی دارد.

سولفات منیزیم دارای آثار اندک بر روی جنین و نوزاد می باشد و تاثیرات سوء آن در اثر مصرف بیش از حد دارو شامل بی حالی، شلی عضلات و کاهش تعداد تنفس در نوزاد می باشد.



مراقبت های حین تزریق دارو

در طول دریافت دارو وضعیت تنفس، فشارخون، مقدار اکسیژن خون و سایر علائم حیاتی شما کنترل میشود.

به دلیل دفع دارو از طریق کلیه اندازه گیری میزان مایعات مصرفی و دفعی اهمیت بسیاری دارد.

اندازه گیری میزان مایعات مصرفی از طریق لیوان مدرج و اندازه گیری مایعات دفعی به وسیله ظرف مدرج ادرار یا از طریق سوند ادراری انجام میشود .

بهتر است بدنیم گرگرفتگی و تنگی نفس خفیف، حین

تزریق دارو، طبیعی و از عوارض جانبی دارو میباشد.





یامن اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

سولفات منیزیم

کد محتوا: ۶۳۳



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

خودمراقبتی

برای پیشگیری از افزایش فشار خون و زایمان زودرس چه اقداماتی انجام دهیم؟

در صورت داشتن هرگونه سابقه بیماری، حتما پزشک و مامای خود را با اطلاع سازید.

در صورت داشتن اضافه وزن، دیابت، سابقه ی فشار خون در بارداری قبلی، سابقه قبلی زایمان زودرس، سن بالای ۳۵ سال حتما تحت نظر پزشک باشید و مراقبت های خود را مرتباً انجام دهید.

به میزان کافی استراحت کنید.

مایعات کافی مصرف کنید.

از شرایط استرس زا دوری کنید.

از مصرف غذاهای پر نمک، چرب و مواد غذایی دارای نگهدارنده پرهیز کنید.

منابع: ویلیامز "۲۰۱۸"، اورژانس های حیاتی مامایی "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"، راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان "بازنگری سوم" تهیه کننده: مطهره اعرفی "کارشناس مامایی" مشاور علمی: دکتر مریم هاشمی "جراح و متخصص زنان و زایمان"

بروز رسانی فریبا شفیعی دفتر آموزش سلامت

الزهر(س) مرداد ۱۳۹۹



موارد هشدار

در صورت بروز هر کدام از علائم زیر حین مصرف دارو، در اسرع وقت به ماما یا پزشک خود اطلاع دهید.

- ✚ تعریق زیاد
- ✚ گرگرفتگی شدید
- ✚ احساس سرما
- ✚ عدم توانایی در حرکت کردن
- ✚ تنگی نفس شدید
- ✚ گرفتگی های شدید عضلات
- ✚ احساس بی حسی در اندام ها
- ✚ احساس سوزن سوزن شدن شدید در اندامها

برای جلوگیری از ایجاد اختلالات ناشی از مصرف دارو، پزشک و مامای خود را از هرگونه بیماری و مصرف هرگونه دارو مطلع سازید.

