

تکنیک عمل

همانطور که در شکل می بینید خط برش چند سانتیمتر عقب تر از خط رویش موهای گیجگاهی شروع میشود و پایین آمده از عقب برجستگی جلوی سوراخ گوش گذشته و محل اتصال نرمه گوش به صورت را دور می زند. سپس در چین پشت لاله گوش کمی بالا می رود با زاویه ای حدود ۹۰ درجه به طرف موهای پشت سر میرود .

در روشهای جدید برش جلوی گوش به سمت عقب کشیده نمی شود.

اگر دقت نمایید خواهید دید که قسمت عمده خط برش در لابه لای موها پنهان میشود و قسمت باقیمانده نیز در محل اتصال لاله گوش به سر محو میشود و بعد از گذشت چند ماه تقریباً جای برش قابل رویت نخواهد بود



باید توجه داشت که هر چند با این عمل چین و چروکهای سطحی پوست کمتر میشود ولی هدف اصلی این عمل کشیدن عضلات ولایه های زیرپوست است .

معمولاً این عمل با سایر اعمال زیبایی مثل لیفتینگ (کشیدن) گردن ، جراحی پلک ، بالا کشیدن ابرو و پیشانی بطور همزمان انجام میشود .

نتیجه عمل

بستگی به سن متقاضی، جنس پوست وی ، میزان کشیدن لایه های زیر پوست و عضلات زیر پوست دارد.
با این عمل چهره شما جوانتر از همسن و سالهای خودتان میشود و باگذشت زمان باز هم شما به نسبت همسن و سالهای خودتان جوانتر خواهید بود .

نوع بیهوشی

این عمل عمدتاً با بیهوشی عمومی قابل انجام است . انتخاب آن توسط جراح و باهماهنگی با شما خواهد بود

مدت عمل

حدود ۳ ساعت

کشیدن پوست (لیفتینگ صورت)

یکی از فواید جراحی های زیبایی ایجاد حس اعتماد به نفس و جوانی است، و شاید مهمترین اجزاء بدن در این رابطه صورت

علل بروز چین و چروک صورت

گذر زمان ، استرس های زندگی و نیز نور خورشید و عواملی هستند که باعث شل شدن عضلات صورت و افزایش چین و چروک صورت می شوند

قبل از عمل

کشیدن پوست صورت که اصطلاحاً لیفتینگ صورت گفته می شود .

و برای جوانتر کردن پوست و حالت صورت طراحی شده است .



انواع روشهای لیفتینگ صورت ابداع شده است که هر کدام در موارد خاص خودش کاربرد دارد.

بهترین فرد برای این عمل فردی است که ساختار استخوانی صورت وی سالم باشد و فقط نسج نرم صورت او خود را شل کرده باشند و فاقد چروکهای ریز فراوان باشد.

سن مناسب برای این عمل بین ۴۰ تا ۶۵ سالگی است اما در سنین بالاتر هم میتوان نتایج مطلوبی را بدست آورد .



یامن اسمه دواء و ذکره شفاء



راهنمای بیمار

جراحی

لیفتینگ صورت

کد محتوا: ۳۱۸



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

۶- از ۲ هفته قبل از عمل تا یک هفته بعد از عمل از خوردن داروهای بروفن ، ایندومتاسین ، پیروکسیکام ، مفنایک اسید و آسپرین خوداری کنید و چنانچه به هر دلیلی نیاز به مسکن داشته باشید فقط از استامینوفن ساده یا استامینوفن کدئینه استفاده نمایید .

۷- چهار هفته قبل و دو هفته بعد از عمل از کشیدن سیگار اجتناب نمایید.

۸- معمولا بعد از عمل از یک گن مخصوص مطابق شکل روبرو برای جلوگیری از تجمع مایع استفاده می شود. خصوصا در مواردی که ساکشن غب (کشیدن چربی با استفاده از لوله های باریک و بدون برش پوستی با دستگاه مکنده) انجام گردد.



تهیه کننده: ناهید سر رشته دار "کارشناس پرستاری"
منبع: WWW.ICCL.MUI.AC.IR درسامه داخلی جراحی برون
سودارت ۲۰۱۸
مشاور علمی: دکتر محمد رضا عسگر زاده "فوق تخصص جراحی پلاستیک"
طراحی و تدوین: مریم اقتداری "کارشناس آموزش سلامت"
پاییز ۱۳۹۴
بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) شهریور ۱۳۹۹



بعد از عمل

- کیبوی مختصری خواهید داشت که در عرض چند روز برطرف خواهد شد.
- بعد از عمل پانسمان شما یک بار عوض خواهد شد. روز سوم میتوانید استحمام کنید.
- حدود روز پنجم بخیه های شما کشیده میشود. در روشهای جدیدتر برش پشت گوش حذف شده است.
- در ضمن در صورت لزوم همزمان با این عمل از ساکشن نیز استفاده میشود.



توصیه ها

- ۱- شب قبل از عمل حمام نمایید و سر خود را بشویید .
- ۲- هنگام ورود به اتاق عمل صورت شما باید فاقد هرگونه آرایشی باشد .
- ۳- تا چند هفته ممکن است احساس کشیدگی پوست صورت را داشته باشید که برطرف خواهد شد.
- ۴- کم حسی ویایی حسی لاله گوش تا چند هفته طبیعی است .
- ۵- بعد از عمل آنتی بیوتیک خود را طبق نظر پزشک مصرف کنید .

