


تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد و تا ۷۰٪ موجب مرگ و میر می شود. بیماری در استانهای سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس از بروز بیشتری برخوردار است و پس از آن تهران، کرمان، یزد، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و بوشهر موارد کمتری دارد.



ویروس این بیماری

میزبان شامل حیوانات اهلی و وحشی از جمله گاو، گوسفند، بز می باشد. پرندگان نسبت به این بیماری مقاوم هستند و در مناطق بومی که مخزن آلودگی در انسان بوده، آلودگی در آنها با شیوع بالا وجود داشته است.



راههای انتقال بیماری به انسان

- انتقال انسان به انسان از طریق خون و ترشحات یا مایعات بدن بیمار آلوده
- انتقال به انسان از طریق ذبح حیوان آلوده و یا در دوره کوتاهی پس از تماس با خون، ترشحات بافت ها یا مایعات حیوان مبتلا
- انتقال عفونت به انسان از طریق گزش کنه آلوده و یا له کردن آن روی پوست
- همچنین امکان انتقال در بیمارستان به دنبال استریل کردن نامناسب وسایل پزشکی و استفاده مجدد از سوزنها و وسایل پزشکی آلوده وجود دارد.



افراد در معرض خطر

دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصاب ها، خانه دار، دامپزشکان، پرستاران، مسافرت یا ساکن بودن در مناطق روستایی



علائم بیماری در دام و انسان

- بیماری در دام علائم مشخص ندارند.
- علائم بطور ناگهانی با تب، ضعف، درد عضلانی، سرگیجه، سردرد و حساسیت به نور شروع می شود. ممکن است حالت تهوع، استفراغ، اسهال، دل درد، سرفه و گلودرد ایجاد می شود.
- سایر نشانه ها شامل افزایش ضربان قلب، بزرگی غدد لنفاوی و دانه های قرمز در پوست یا غشا مخاطی مانند دهان و حلق می باشد.
- دانه های قرمز ممکن است به سیاهی تبدیل یا سایر تظاهرات خونریزی دهنده مثل، خونریزی از بینی، لثه و رحم و یا ادرار خونی ایجاد شود.



تشخیص بیماری

- از روی علائم بیماری
- آزمایش های تخصصی خون

دوره نهفتگی

- مدت زمانی که معمولا طول می کشد تا بیماری علائم خود را نشان دهد ۱ تا ۳ روز و حداکثر ۱۳ روز است.





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

تب خونریزی دهنده

کریمه کنگو

کد محتوا: ۳۶۵



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

- ۷- در صورت وجود زخم در بدن از تماس آن با لاشه و ترشحات و خون دام جدا جلوگیری گردد.
- ۸- کشتار دام در کشتارگاه ها و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی صورت پذیرد .
- ۹- تهیه گوشت از مراکز عرضه معتبر و دارای مهر دامپزشکی صورت گردد .
- ۱۰- قبل از مصرف گوشت تازه حداقل ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شود .
- ۱۱- در هنگام خرد کردن گوشت قرمز در منازل از دستکش استفاده شود .
- ۱۲- در هنگام مراقبت از بیمار دستکش و سایر وسایل حفاظتی استفاده شود.
- ۱۳- تجهیزات و وسایلی که با ترشحات بیمار در تماس بوده اند باید با حرارت یا مواد گندزدای کلردار ضدعفونی شوند.
- ۱۴- رعایت احتیاطات همه جانبه برای عدم مواجهه خون و ترشحات بیماران با مخاط ها و پوست غیر سالم ضروری است.
- ۱۵- اطلاع رسانی سریع به نزدیکترین مرکز بهداشتی در صورتیکه چندین فرد مشکوک با علائم ذکر شده مشاهده گردید.

تهیه کننده گان: بگاه قائد امینی "کارشناس پرستاری"
منبع: راهنمای جامع نظام مراقبت های بیماریهای واکسیناسیون واکسیناسیون واکسیناسیون
درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت ۱۳۹۱ زیر نظر دکتر گویا
مشاور علمی: دکتر سید کامیار مصطفوی زاده "متخصص بیماریهای عفونی"
طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"
بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) مرداد ۱۳۹۹



درمان بیماری

- ۱- در انسان درمان با داروی ریباورین توصیه شده است .
- ۲- واکسنی برای پیشگیری در حیوانات وجود ندارد
- ۳- درمانهایی شامل تامین آب بدن بیمار برای جبران کم آبی
- ۴- اقدامات بهداشتی جهت کنترل و پیشگیری از بیماری
- ۱- کاهش خطر انتقال بیماری از کنه به انسان
- ۲- پوشیدن لباس مناسب (آستین بلند، شلوار بلند)
- ۳- پوشش لباس روشن برای تشخیص ساده کنه روی آن
- ۴- استفاده از کنه کش ها بر روی لباس
- ۵- از له کردن کنه ها با دست مطلقاً خودداری شود
- ۶- سمپاشی نمودن بدن دام و اماکن دامی با سموم ضد کنه ، تا کنه های ناقل از بین بروند .
- ۷- کسانی که با دام و لاشه و ترشحات و خون دام در تماس هستند، میبایست از وسایل ایمنی نظیر لباس کار ، چکمه ، دستکش ، ماسک و عینک استفاده نمایند .

