

تب مالت "بروسلوز"

یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که توسط یک باکتری به نام بروسلا ایجاد می شود.

انسان در تماس با حیوانات و یا محصولات و یا فراورده های تولید شده از حیوانات مبتلا می شود.

تب مالت بیشتر در بز، گوسفند، گاو، خوک، سگ و موش ایجاد می شود.



راه های انتقال به انسان

تماس مستقیم انسان با حیوانات آلوده

ورود ترشحات حیوانات از راه خراش های پوستی و یا مخاط ها به انسان

اشتقاق باکتری حیوان مبتلا توسط انسان

خوردن محصولات دامی غیر پاستوریزه مثل شیر و فراورده های آن نظیر پنیر، سرشیر، خامه و بستنی آلوده به باکتری.

توجه

محصولاتی که پس از جوشاندن کامل شیر تولید می شوند مثل ماست، کشک، دوغ، قره قورت آلوده نمی باشند.

گوشت دام ها دارای آلودگی کمتری است ولی اگر به طور کامل پخته نشوند می توانند بیماری را باشند مثل کباب نیم پز.

بیماری بیشتر در بین چوپانان، دامداران، قصاب ها، شکارچیان و کارکنان دامپزشکی و آزمایشگاه دیده می شود.



علائم و تظاهرات بالینی

تب مالت علائم اختصاصی ندارد

تب مالت با بایحالی، بی اشتها، سردرد، تعریق، درد عمومی بدن مشخص می شود و گاهی ممکن است بیماران احساس افسردگی هم داشته باشند.

دوره ی کمون بیماری حدود ۲ تا ۴ هفته است و بیماری ممکن است به صورت تدریجی و یا ناگهانی شروع شود تب در این بیماری به صورت نوسان دار و موج است.

تب مالت ممکن است عوارض گوارشی و یا کم خونی ایجاد کند و یا عارضه های اسکلتی، درگیری زانو، لگن و مچ و درد در این نواحی ایجاد کند.



تشخیص

بیماری با شرح حال که از بیمار گرفته می شود و علائم بالینی و یک سری تست های اختصاصی خون تشخیص داده می شود.



یا من اسم دواء و ذکره شفاء



راهنمای بیمار

تب مالت

"بروسلوز"

کد محتوا: ۱۴۸



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

تغذیه

تغذیه در بیماران تب مالت اهمیت زیادی دارد
این بیماران باید خامه و کره ی پاستوریزه زیاد مصرف کنید.

از مصرف سرشیر خودداری کنید
مصرف ویتامین D هم از اهمیت زیادی برخوردار است.
افراد مبتلا به تب مالت که با دام ها در تماس بوده اند باید بررسی و دام های آن واکسینه شوند.



تهیه کننده: فاطمه خیری "کارشناس پرستاری"
منبع: راهنمای جامع نظام مراقبت های بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت
بهداشت ۱۳۹۱ زیر نظر دکتر گویا

مشاور علمی: دکتر پوراحمد "متخصص بیماریهای عفونی"
طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"
بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) مرداد ۱۳۹۹



درمان

درمان با مصرف آنتی بیوتیک ها انجام میگردد
معمولا داکسی سایکلین به همراه ریفامپین به مدت ۶-۱۲ هفته استفاده می شود.
هنگام مصرف ریفامپین رنگ ادرار به نارنجی تغییر می کند و ممکن است لنزهای نرم تماسی تغییر رنگ بدهند مشکل نیست بعد از قطع دارو برطرف میشود
ریفامپین باعث کاهش اشتها هم می شود.



پیشگیری

خودداری از مصرف شیر غیر پاستوریزه و لبنیات و گوشت های تأیید نشده
از وسایل حفاظتی مثل دستکش ، محافظ چشم در هنگام تماس با حیوانات استفاده کنید.

