


## علایم سکته قلبی



- درد، احساس ناراحتی، فشار یا سنگینی در مرکز قفسه سینه یا مکان های نشان داده شده در شکل فوق که بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد.
- تنگی نفس با یا بدون احساس ناراحتی قفسه سینه.
- انتشار درد یا ناراحتی به یک یا هر دو بازو، گردن، فک یا معده و محل هایی که در شکل مشخص شده است.
- **سایر علایم:** تعریق سرد، تهوع، استفراغ و سبکی سر.

**مبتلایان به دیابت ممکن است درد نداشته باشند، بنابراین توجه به همه علایم ضروریست.**

## هنگام بروز درد قلبی چه باید کرد؟


بیماران با آنژین قلبی باید نیتروگلیسیرین زیر زبانی یا اسپری نیتروگلیسیرین را همیشه همراه داشته باشند. نیتروگلیسیرین با گشاد کردن عروق کرونر قلب باعث افزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی به قلب می شود و احتمال سکته قلبی را کاهش می دهد.

## مشخصات درد قلبی چیست؟

- ✓ حملات آنژین بطور مشخص در هوای سرد و یا در اثر فعالیت بدنی، هیجان روحی، بعد از خوردن یک غذای سنگین و یا فعالیت جنسی ایجاد می شوند.
- ✓ آنژین قلبی معمولاً با استراحت و یا پس از گذاشتن نیتروگلیسیرین زیر زبانی کاهش می یابد.
- ✓ درد معمولاً طی ۳ تا ۵ دقیقه بهبود می یابد و به ندرت بیش از ۳۰ دقیقه طول می کشد



اگر درد قلبی با استراحت و استفاده از ۳ فرق  
نیتروگلیسیرین در عرض ۱۵ دقیقه خوب نشد،  
باید اورژانس ۱۱۵ را خبر نمایید یا فرد را به  
نزدیکترین مرکز درمانی یا اورژانس منتقل نمایید.



## سکته قلبی چیست؟

سکته قلبی وقتی رخ می دهد که بخشی از عضله قلب در اثر ایجاد لخته در محل رسوبات چربی یا تنگی و انسداد ناشی از اسپاسم یا پلاک، دچار گرفتگی کامل شده و در اثر نرسیدن اکسیژن، به صورت برگشت ناپذیر دچار آسیب شود.

## درد قلبی یا آنژین صدری چیست؟

آنژین قفسه صدری یا درد قلبی احساس در یا ناراحتی در قفسه سینه می باشد و زمانی رخ می دهد که قلب به اندازه کافی خون حاوی اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. به مرور زمان با افزایش سن، سرخرگ های قلب(عروق کرونر) که تامین کننده خون مورد نیاز برای فعالیت قلب هستند، ممکن است در اثر استرس تنگ شوند یا در اثر رسوپ چربی، کلسترول و سایر مواد(لخته یا پلاک) دچار سخت شدگی و انسداد شوند.

### گرفتگی عروق در آنژین صدری



عامل اصلی آنژین تصلب شرایین می باشد که عوامل مانند دیابت، چربی خون بالا، پرشاری خون و استرس و سابقه فامیلی مثبت بیماری قلبی در ایجاد آن مؤثر است.

یامن اسمه دواء و ذکره شفاء



# راهنمای بیمار درد قلبی و کتول آن

## کد محتوا: ۱۰۴



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

۱۵ تا ۲۰ دقیقه پس از مصرف دارو بنشینید تا از افت فشارخون و افتادن شما جلوگیری شود.

اگر درد بعد از مصرف ۳ قرص زیر زبانی در عرض ۱۵ دقیقه کاهش نیافتد، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.

### نحوه تهیه و نگهداری نیتروگلیسیرین



- ✓ نیتروگلیسیرین را قبل از اتمام و هر ۶ ماه به صورت تازه تهیه کنید.
- ✓ نیتروگلیسیرین را در ظرف مخصوص، جدا از داروهای دیگر، دور از نور و در درجه حرارت خنک نگهداری و از سرمای زیاد و یخ زدگی حفظ کنید.
- ✓ همیشه قرص را با خود همراه داشته باشید.
- ✓ دارو را در جیب خارجی کت یا کیف دستی حمل و از تماس آن با بدن (مانند قرار دادن در جیب پیراهن یا شلوار) خودداری کنید.

پدیده اورنده: زرین تن ساز - کارشناس ارشد پرستاری(پرستار آموزش بیماری های قلبی عروقی مرکز الزهر) \* مشاورین علمی: دکتر علیرضا خسروی و گروه داخلی - قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .

طرح تدوین: پروانه خراسانی "دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان" (مسئول بروزه NEARER نگشتش نقش آموزش الزهر) منبع: درسته ای پرستاری داخلی جراحی بروز سودارش ۲۰۱۸۰۸. مراجعت پرستاری پریزه دکتر محمد رضا عسگری و دکتر محسن سیمایی. بروز رسانی مریم اقتداری و اکرم ابراهیمیان "کارشناسان ارشد پرستاری" اردیبهشت ۱۳۹۹

### نحوه کنترل درد قلبی با مصرف نیتروگلیسیرین

۱. داروهایتان را طبق دستور پزشک قبل از هر فعالیتی که ممکن است درد ایجاد کند مصرف نمایید.

۲. در صورت بروز درد، در حال انجام هر نوع فعالیتی که هستید، فعالیت خود را متوقف و استراحت کنید.

۳. تا برطرف شدن درد به استراحت خود ادامه دهید. از استرس و فعالیت سنگین دوری و وعده غذایی سبک و کم چربی مصرف کنید.

۴. اگر درد با استراحت به سرعت کاهش نیافتد، یک عدد قرص نیتروگلیسیرین زیر زبانی را می توانید زیر زبان بگذارید یا یک اسپری زیر زبان بزنید.

۵. نشانه تازگی و موثر بودن دارو، سردرد پس از مصرف یا سوزشی است که در زبان ایجاد می کند. تا زمان آب شدن کامل قرص زیر زبانی آب دهان را قورت ندهید.

۶. به محض تسکین درد قلبی می توانید، هر مقدار قرص که زیر زبان باقی مانده را دور ببریزید.

۷. اگر درد تسکین نیافتد ۲ قرص دیگر به فاصله ۵ دقیقه مصرف کنید.

۸. عوارض جانبی قرص شامل سردرد، برافروختگی، افت فشارخون و افزایش ضربان قلب است. برای رفع سردرد از استامینوفن استفاده کنید.