

میرنگوتومی

باز کردن پرده گوش

گوش یک عضو حسی با عملکرد دوگانه شنوایی و تعادل است برای تکامل طبیعی و حفظ توانایی تکلم و برقراری ارتباط با دیگران حس شنوایی ضروری میباشد. تعادل نیز برای حفظ حرکات بدن نگهداری وضعیت و انطباق بدن لازم است.

ساختمان و عملکرد ظریف و حساس گوش موجب شده است که حفظ شنوایی و تعادل طبیعی مستلزم تشخیص زودرس و دقیق اختلالات گوش باشد.

عفونت گوش میانی حاد از جمله این اختلالات میباشد. این بیماری عفونت حاد گوش میانی است که طول مدت آن معمولا کمتر از ۶ هفته است. علائم بسته به شدت عفونت متغیر است
این علائم عبارتند از:

- درد گوش
- ترشح از گوش
- تب
- کاهش شنوایی

درمان

۱. درمان دارویی با آنتی بیوتیک ها
۲. درمان جراحی میرنگوتومی : ایجاد برش در پرده صماخ میباشد.



میرنگوتومی عمل جراحی است که جهت اقدامات تشخیصی مثل تعیین نوع میکروب یا درمانی در موارد عفونت گوش میانی حاد انجام میشود.




شیوه عمل

- در کلیه مبتلایان به عفونت حاد گوش میانی (اوتیت میانی حاد) و مخصوصا در کودکان بهتر است تحت بیهوشی عمومی انجام شود ولی در بالغین توسط افراد با تجربه با بی حسی موضعی به صورت سرپائی انجام میشود.
- بیمار در وضعیت دراز کش یا نشسته قرار میگیرد و در حالی که سر به یک سمت چرخیده شده باشد با کمک میکروسکوپ جراحی با ملایمت کانال گوش تمیز میشود. در زیر میکروسکوپ برش کوچک پرده صماخ داده میشود.
- در بیمارانی که ترشحات چرکی دارند یا نیاز به باز بودن پرده صماخ به مدت طولانی میباشد برش بزرگتر داده میشود.



لازم به ذکر است ترشح حاصله از میرنگوتومی باید به منظور کشت به آزمایشگاه ارسال شود تا میکروب عامل عفونت شناسائی و آنتی بیوتیک مناسب تجویز شود.



مراقبت های بعد از عمل

- بینی را در هفته اول بعد از عمل جراحی به آرامی پاک کنید.
- دو الی سه هفته بعد از عمل از مسافرت هوایی خودداری کنید.
- آنتی بیوتیک ها و سایر داروها را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- دو الی سه روز بعد از جراحی می توانید به کار قبلی خود برگردد اما از بلند کردن اجسام سنگین زور زدن و خم شدن برای چند هفته اجتناب کنید.





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

خود مراقبتی در باز

کردن پره گوش

"میرنگتومی"

کد محتوا: ۴۴۱

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

✚ در طول حمام کردن سر خشک باشد و در هنگام خروج از حمام سر را شستشو دهید .

✚ افزایش ترشحات یا خروج چرک از گوش اطلاع داده شود .

✚ اتفاقات طبیعی بعد از این عمل شامل کاهش شنوایی در گوش عمل شده به علت پانسمان ، وجود صداهایی در گوش از قبیل صدای شکاف یا ترکیدن ، درد خفیف گوش و احساس ناراحتی در چانه و فک و سرگیجه به هنگام اولین حرکت می باشد و جای نگرانی نیست .

تهیه کننده : سمانه ماندی زاده "کارشناس پرستاری"
منبع: درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث ۲۰۱۸
مشاور علمی: دکتر سید حمیدرضا ابطحی "متخصص گوش و حلق و بینی"
طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزرآموزش سلامت"
روز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س)شهریور ۱۳۹۹

✚ دو الی سه هفته بعد از عمل سرفه و عطسه را بادهان باز انجام دهید .

✚ سه الی پنج هفته ممکن است احساس صدا در گوش عمل شده داشته باشید به دلیل وجود پانسمان و مایع و خون در گوش کاهش شنوایی موقت خواهد بود .

✚ در صورت شدت یافتن درد با جراح تماس بگیرید

✚ اگر از گوش عمل شده خون خارج شد جای نگرانی نیست به طرف گوش عمل شده بخوابید تا خون تخلیه شود .

✚ تا دو هفته از ورود آب به گوش عمل شده جلوگیری کنید .

✚ زیر سر بالا باشد تا التهاب گوش میانی کم شود .

✚ برای حمام کردن پنبه چرب داخل مجرا گذاشته شود و بعد از استحمام داخل گوش را با سشوار خشک کنید.

✚ در صورت نیاز پنبه موجود در گوش خود را تعویض کنید .