

دستگاه گوارش

لوله گوارش شامل مری، معده و اثنی عشر - روده کوچک و بزرگ و مقعد می باشد روده قسمتی از دستگاه گوارش است که غذا بعد از هضم در معده وارد روده می شود و در آنجا هضم و جذب بیشتری صورت می گیرد و نهایتاً به صورت مدفوع از مقعد خارج می شود.

انسداد روده

انسداد یعنی قسمتی از روده به دلایل مختلف مسدود شده است و خروج مواد دفعی از آن صورت نمی گیرد

علت

عصب نداشتن قسمتی از روده، تشکیل نشدن قسمتی از روده، تجمع مدفوع غلیظ و چسبناک، مقعد بدون سوراخ، عفونت ناشی از مدفوع داخل شکم تومورها، پیچ خوردن روده دور هم.

علائم بیماری

استفراغ سبز رنگ، نفخ شکم، عدم دفع مدفوع طی ۴۸ ساعت بعد از تولد.



تدابیر درمانی

در اکثر موارد انسداد روده به درمان جراحی نیاز دارد. اگر مقعد بدون سوراخ داشته باشد و یا در مواردیکه روده عصب ندارد احتمالاً جراحی با استومی همراه است یعنی قسمتی از روده را از شکم بیرون می گذارند و مدفوع از این قسمت خارج می شود تا زمانیکه وزن نوزاد افزایش یابد در این موقع عمل اصلی انجام شده و روده را داخل می گذارند.

آموزش مراقبت از استومی

(استومی=بیرون گذاشتن سر روده از جدار شکم جهت دفع مدفوع)

اندازه استومی بعد از عمل جراحی بزرگ و متورم است که با گذشت زمان و چندین هفته اندازه آن کوچک می شود.

می توان با داشتن استومی حمام کرد ولی مراقب باشید کف صابون داخل استومی نشود.

از لباسهایی استفاده شود که نخی و آزاد باشد و کمتر ایجاد تعریق کند.

بافت استومی حس ندارد از ضربه به آن خودداری شود چون ضربه باعث خونریزی آن می شود.

بعد از هر بار مدفوع حتماً پوست اطراف استومی از مدفوع پاک شود. که برای این کار از پارچه نرم و آب نیم گرم استفاده می شود.



پوست محل اطراف استومی با پماد ویتامین A+D یا هر گونه پماد چرب کننده پوست آغشته شود و چند عدد گاز روی آن قرار داده شود و پانسمان گردد و بعد از هر بار دفع، گازها تعویض شوند.

احتمال زخم شدن پوست اطراف کله استومی به دلیل تماس مداوم مدفوع با پوست زیاد است اگر زخم خیلی وسیع شد حتماً به پزشک مراجعه کند.

نمای ظاهری استومی





یامن اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار انسداد روده نوزادان

کد محتوا: ۵۷۹




<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

رژیم غذایی

در نوزادان صرفاً شیر مادر




تهیه کننده: معصومه شهباز "کارشناس ارشد پرستاری" و معصومه حبیبی "کارشناس پرستاری"
منبع: درسنامه جراحی کوران ۲۰۱۵
مشاور علمی: دکتر علی حزینی "فوق تخصص جراحی کودکان"
طراحی و تدوین: بروز رسانی اقتداری "کارشناس پرستاری" دفتر آموزش سلامت الزهرا(س)
بهمن "۱۴۰۰"



در صورت علائم زیر حتماً به پزشک مراجعه کند.

- ۱) تغییر رنگ در استوما (از قرمز روشن به بنفش تیره)
- ۲) خونریزی مداوم
- ۳) درد شکم همراه با عدم خروج مدفوع و تهوع و استفراغ
- ۴) تغییر غیر طبیعی در شکم و اندازه استوما
- ۵- اسهال مداوم همراه با کاهش حجم آب بدن
- ۶- زخم وسیع اطراف استومی



تدابیر پرستاری

- + حمایت عاطفی بیمار و برقراری آسایش او
- + دادن اطلاعات کافی به بیمار و همراهان درباره بیماری. مراقبت از کلوستومی که شامل شستشوی ناحیه ی استوما و پیشگیری از عفونت است.
- + حمایت از تصویر ذهنی مثبت باتشویق بیمار به بیان احساسات

