

واکسیناسیون

افراد تحت عمل جراحی پیوند

- ✚ واکسیناسیون برای بیماران تحت عمل جراحی پیوند مانند پیوند کلیه ، کبد ، قلب ، ریه و ... انجام میشود
- ✚ بعضی از واکسن ها در صورت لزوم باید بعد از پیوند تزریق شود .
- ✚ حتی این واکسن ها را چند روز قبل از پیوند تزریق کرده باشید ، ممانعتی برای پیوند ایجاد نمی کند.

کزاز و دیفتری

- ✚ این واکسن هم قبل از پیوند و هم بعد از پیوند قابل تزریق است .
- ✚ دیفتری کزاز که به واکسن توأم بزرگسال نیز معروف است برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کزاز و دیفتری به کار می رود.
- ✚ این واکسن که به شکل مایع مورد استفاده قرار می گیرد
- ✚ این واکسن با حجم نیم سی سی و به صورت عضلانی تزریق می گردد.



- ✚ درد در محل تزریق که در ۱۰ درصد افراد ممکن است بین یک تا سه روز پس از تزریق واکسن ایجاد شود و همراه با قرمزی، گرما و تورم در همان محل باشد. این واکنش پس از تزریق آخر بیشتر از دوزهای اولیه دیده می شود.
- ✚ برای مداومت در ایمنی علیه کزاز نیاز به تزریق آن هر ۱۰ سال می باشد

آنفلانزا

- ✚ این واکسن به صورت سالانه تزریق میشود .
- ✚ تزریق این واکسن بطور معمول برای افراد تحت عمل جراحی پیوند بخصوص سالمندان و بچه ها توصیه میشود .
- ✚ واکسن آنفلانزا برای جلوگیری از بروز نوع شدید آنفلانزا تزریق میشود .
- ✚ این واکسن به صورت سوسپانسیون در سرنگ های آماده مصرف و به شکل مایع شفاف و بی رنگ است
- ✚ برای پیشگیری از ابتلا به آنفلانزا به خصوص در افرادی که در صورت ابتلا به آنفلانزا در معرض خطر بروز عوارض آن قرار دارند، توصیه می شود.

واکسیناسیون به خصوص برای بیماران زیر با در نظر گرفتن سیاست های ملی ایمن سازی توصیه می شود:

- ✚ افراد با سن ۶۵ سال و بالاتر، بدون در نظر گرفتن شرایط جسمانی آنها.
- ✚ بزرگسالان و کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی یا قلبی شامل آسم.
- ✚ بزرگسالان و کودکان مبتلا به بیماری های مزمن مانند دیابت.
- ✚ بزرگسالان و کودکان مبتلا به اختلالات مزمن عملکرد کلیه.
- ✚ بزرگسالان و کودکان مبتلا به نقص سیستم ایمنی ناشی از بیماری ها یا مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی (مانند کورتون) یا رادیو تراپی.
- ✚ واکسیناسیون لازم است در بیماران مبتلا به تب یا عفونت حاد به تعویق انداخته شود.
- ✚ ایمنی معمولاً بین دو تا سه هفته ایجاد می شود. مدت ایمنی پس از تزریق واکسن بین شش تا ۱۲ ماه است.
- ✚ این واکسن را لازم است در دمای بین دو تا هشت درجه سانتی گراد (یخچال) و به دور از نور و انجماد نگهداری کنید.

- ✚ قبل از تزریق، واکسن را به دمای حدود ۲۵ درجه سانتی گراد (دمای استاندارد اتاق) برسانید. سرنگ را قبل از تزریق به آرامی تکان دهید.

هیپاتیت آ "A"

- ✚ به تمام بیماران پیوند کبد ، تزریق این واکسن توصیه میشود
- ✚ در سایر موارد پیوند مثل : کلیه ، قلب و ...
- ✚ اگر بیمار قصد سفر به محل هایی که احتمال ابتلا به این بیماری زیاد است را دارد ، می تواند یک ماه قبل از سفر استفاده کند .

- ✚ واکسن در دو مرحله به فاصله ۶ ماه دریافت شوند.
- ✚ این واکسن را می توان با سایر واکسنهای تزریق کرد
- ✚ مشکلات پس از تزریق واکسن درد در ناحیه تزریق ، سردرد بی اشتها و خستگی که معمولاً اگر ایجاد شود تا ۲ روز ادامه پیدا می کند.

هیپاتیت بی "B"

- ✚ می توانید بعد از پیوند این واکسن را تزریق کنید .
- ✚ تلقیح واکسن بصورت عضلانی و بر روی عضله بازو انجام میگردد
- ✚ کسالت، ضعف، سرگیجه، سردرد و یا خستگی جزئی و خفیف پس از دریافت واکسن که در مدت کوتاهی برطرف میگرددند.





یامن اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار واکسیناسیون در افراد تحت عمل جراحی پیوند

کد محتوا: ۵۰۵

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

✚ اگر مثلاً ۱۰ روز قبل از پیوند یکی از این واکسن های ویروس زنده را تزریق کرده باشید، نمی توانید پیوند شوید .

✚ در مورد اطفال حداقل تا ۴ هفته قبل از پیوند باید واکسن سرخک ، فلج اطفال تزریق شده باشد .

✚ در مورد واکسن فلج اطفال در صورت لزوم می توان از واکسن فلج اطفال با ویروس غیر فعال نه ویروس زنده استفاده کرد .

تهیه کننده: فاطمه ازنده "کارشناس پرستاری"
منبع: راهنمای سیاستهای ملی واکسیناسیون کشوری "مرکز بهداشت استان"
مشاور علمی: خانم دکتر پابین هدایتی "فوق تخصص نفرو لوژی"
طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"
بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) خرداد ۱۳۹۹

✚ می توان از یک واکسن ترکیبی برای هپاتیت آ و بی B استفاده کرد

✚ واکسن برای هپاتیت آ و بی B در دسترس میباشد، اما برای هپاتیت سی "C" خیر.

✚ نوبت اول: هر زمان. (هر چه زودتر بهتر)

✚ نوبت دوم: بایستی حداقل یک ماه پس از مرحله نخست تزریق گردد. (یک تا ۲ ماه بعد از دوز اول)

✚ نوبت سوم: بایستی حداقل ۵ ماه بعد از دوز دوم بطور روتین: هر زمان ۱ ماه بعد ۵ ماه بعد.

✚ چنانچه نسبت به دیگر عوامل بیماریزا واکسینه شده اید، انجام واکسیناسیون هپاتیت بی B بلامانع است.

✚ تزریق همزمان واکسیناسیون هپاتیت بی B با سایر واکسن ها نیز مجاز است.

✚ واکسن آبله مرغان ، سرخک ، سرخچه و فلج اطفال نباید تزریق شود.

✚ به طور کلی از واکسیناسیون ویروس های زنده مثل سرخک ، سرخچه ، فلج اطفال باید اجتناب کنید.

✚ در واقع حتی باید از مواجهه با مایعات بدن افرادی که به تازگی با این واکسن واکسینه شده اند دوری کنید .

✚ این ویروس زنده می تواند تا ۳ ماه بعد از واکسیناسیون در مایعات بدن ترشح شوند .

✚ واکسن تب زرد و سل همزمان با آن تزریق نشود