

## قرص مایفورتیک

قرص مایفورتیک بعنوان یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی میباشد که جهت پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوند کلیه و کبد بکار میرود .  
این دارو به صورت قرص های ۱۸۰ میلی گرمی و ۳۶۰ میلی گرمی موجود میباشد .

### شکل دارو



### توجه

دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود . ( در دمای اتاق و دور از نور و رطوبت )  
دارمان را به هیچ وجه قطع نکنید مگر به دستور پزشک ، زیرا قطع درمان می تواند باعث خطر رد پیوند شود .

مایفورتیک را می توانید با یا بدون غذا مصرف نمائید

هم زمان با داروی دیگری مصرف نشود .

مایفورتیک را بطور کامل با یک لیوان آب میل نمائید ، از شکستن و خرد کردن قرص ها خودداری نمائید .

از تماس مستقیم دارو با پوست دست خودداری فرمائید .

در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو به محض یاد آوری آن را بخورید و نوبت بعد مجددا طبق برنامه قبلی میل شود .

مایفورتیک و تاکرولیموس با فاصله زمانی ۲ ساعت از هم مصرف گردد .

مصرف مایفورتیک طی بارداری خطرناک بوده و در صورت بارداری پزشک خود را مطلع نمائید .

طی درمان و ۶ هفته بعد از قطع درمان با مایفورتیک از شیردهی اجتناب نمائید .



خانم ها طی درمان و به مدت ۶ هفته پس از قطع درمان از روش های جلوگیری از بارداری استفاده نمایند

**آقایان طی درمان و ۱۳ هفته بعد از قطع درمان با مایفورتیک باید از کاندوم استفاده نمایند همسر شما نیز طی درمان شما با مایفورتیک ۱۳ هفته بعد از قطع درمان شما از داروی ضد بارداری استفاده نمایند .**

در صورت باردار شدن همسران طی مصرف مایفورتیک فوراً با پزشک خود صحبت نمائید .

**در ساعت هایی که نور خورشید تشعشعات بیشتری دارد ( بین ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر ) از منزل خارج نشوید و اگر مجبور شدید از منزل خارج شوید از کرم ضد آفتاب و لباس های محافظ ( کلاه نقاب دار ، دستکش های رنگ روشن و عینک آفتابی ) استفاده نمائید .**



یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



**راهنمای بیمار  
قرص مایفورتیک  
(مایکوفنولات سدیم)  
کد محتوا: ۵۵۹**

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

**در صورت بروز علائم زیر پزشک خود**

**را مطلع سازید .**

- ✚ سردرد
- ✚ یبوست
- ✚ تهوع و استفراغ
- ✚ کاهش اشتها
- ✚ اسهال
- ✚ حساس شدن معده
- ✚ گیجی و اختلال در تمرکز و صحبت کردن
- ✚ نفخ شکم
- ✚ مشکلات خواب
- ✚ سرفه
- ✚ درد نظیر درد شکمی و معده

**در صورت نیاز به دریافت واکسن**

**زنده ابتدا با پزشک خود مشورت  
نمائید .**

تهیه کننده: مهتاب کمال "کارشناس پرستاری"

منبع فارماکولوژی پرستاری ویرایش دوم ۲۰۱۹

مشاور علمی: آقای دکتر سجادیه "فوق تخصص نفرولوژی"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) مرداد ۱۳۹۹



**عوارض جانبی که می تواند جدی**

**باشد .**

- ✚ تب
- ✚ لرز
- ✚ تعریق
- ✚ احساس خستگی
- ✚ خواب آلودگی و فقدان انرژی و کرختی
- ✚ تغییرات بینائی
- ✚ از دست دادن حافظه
- ✚ سختی در تکلم و فهم سخن گفتن
- ✚ ضعف عضلانی
- ✚ سر درد
- ✚ تنگی نفس حین فعالیت
- ✚ درد قفسه سینه
- ✚ رنگ پریدگی

**در صورت مشاهده هر گونه خون**

**مردگی غیر منتظره یا خونریزی یا**

**هر کدام از علائم فوق به پزشک**

**خود مراجعه نمائید .**

**بهداشت دهان و معاینه دندان ها را**

**بعلت تأثیر دارو روی لثه ها بایستی**

**بصورت مرتب رعایت کنید .**

