


تشخیص گلومرونفریت

- ۱- آزمایش خون که در این بیماران: افزایش کراتینین و اوره سرم و آنمی (کم خونی) مشهود می باشد.
- ۲- آزمایش ادرار جهت تعیین وجود پروتئین یا سایر عناصر غیرطبیعی مانند خون در ادرار
- ۳- جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته



علائم گلومرونفریت

علائم و نشانه های این بیماری با توجه به حاد یا مزمن بودن آن و علت بیماری می تواند متفاوت باشد.

- رنگ صورتی، قرمز یا دودی ادرار در اثر وجود خون در آن
- تهوع و استفراغ
- کف آلود بودن ادرار به دلیل وجود پروتئین
- کم شدن مقدار ادرار نسبت به حالت معمول
- خستگی و گاهی سردرد
- تورم اطراف صورت، چشم ها، مچ پا، پاها و شکم به خصوص در صبح
- افت فشار خون یا بالعکس بالا رفتن فشار خون
- تب، بی اشتها
- درد پهلو
- کاهش قدرت بینایی

گلومرونفریت

ملتهب شدن گلومرول ها (فیلترهای کوچک و گردی که در کلیه ها وجود دارند و عمل تصفیه خون را انجام می دهند) گلومرونفریت را به وجود می آورد. این بیماری با نام های سندرم نفریت حاد و گلومرونفریت بعد از عفونت نیز شناخته می شود. این بیماری به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:

- ۱- گلومرونفریت حاد که کلیه ها به سرعت دچار آسیب می شوند.
- ۲- گلومرونفریت مزمن که بعد از گلومرونفریت حاد یا بیماری های کلیوی ایجاد می شوند و تدریجا کلیه ها آسیب می بینند




یامن اسمہ دوائ و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

گلو مرونفریت

کد محتوا: ۶۰۳



تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

دیالیز برای جلوگیری از بهم خوردن تعادل آب، الکترولیت ها و تقلیل خطر پیدایش عوارض نارسایی کلیه انجام می شود.

رژیم غذایی

کاهش مصرف غذاهای پرپروتئین مثل گوشت، تخم مرغ، حبوبات، و غیره طبق نظر پزشک و مشاور تغذیه مصرف شوند. در صورت داشتن ورم، فرد باید مصرف نمک و مایعات را کاهش دهد. کاهش مصرف میوه یاسبزیجات حاوی پتاسیم بالا مثل موز، انار گوجه فرنگی باید محدود شود. کنترل وزن روزانه و حفظ وزن مطلوب با نظر متخصص تغذیه

تهیه کننده: علیرضا دشتی "کارشناس ارشد پرستاری"

منبع: درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر سوارث ۲۰۱۸

مشاور علمی: دکتر شهرام طاهری "فوق تخصص نفرولوژی"

طراحی و تدوین: دفتر آموزش همگانی الزهرا (س) "مریم اقتداری"

کارشناس ارشد پرستاری

۱۳۹۸ پاییز بروز رسانی مرداد ۱۳۹۹

درمان

درمان گلو مرونفریت به حاد یا مزمن بودن آن؛ علت زمینه ای بیماری و نوع و شدت علائم بستگی دارد.

- درمان فشار خون بالا توسط داروهای ضد فشار خون
- محدودیت آب و سدیم در رژیم غذایی
- در موارد حاد، با نظر پزشک مصرف داروهای (مهار کننده سیستم ایمنی) توصیه می شود.
- جهت کاهش بار مصرف مایعات مصرف داروهای ادرار آور به بیمار توصیه می شود.
- اگر بیمار کم خونی داشته باشد، مکمل های آهن و ویتامین و امپول اریتریتین تجویز می شود.