



کد: ۵۲۹

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

قرص وارفارین

شکل ظاهری: قرص های ۵ میلی گرمی صورتی رنگ

موارد مصرف: جهت پیشگیری از ایجاد لخته، برای بی نظمی های ضربان قلب، گرفتگی رگهای قلب، سکته قلبی، بعد از تعویض دریچه قلب، آمبولی ریه، لخته در سیاهرگها در صورت داشتن موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

کبودی به اندازه بیش از کف دست، خونریزی طولانی از بینی، لثه یا دهان یا سرفه و خلط خونی، پیدا شدن نقاط ریز قرمز روی پوست، سردرد شدید، درد ناگهانی شکم و کمر، قیری یا تیره شدن مدفوع، ادرار خونی

نکات مهم هنگام مصرف:

دارو را داخل ظرف سر بسته نگه دارید. دارو را ساعت ۵ بعد از ظهر با معده خالی و یک لیوان آب بخورید. در صورتی که ناراحتی گوارشی دارید با غذا مصرف کنید. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف نوبت بعد را دو برابر نکنید. قبل از جراحی و دندانپزشکی با پزشک مشورت کنید. برای انتخاب نوع داروی ضد حاملگی مناسب با پزشک و پرستار مشورت نماید و از ابزارهای داخل رحمی (IUD) استفاده ننماید. در حاملگی از این دارو استفاده نکنید

نکات مهم آزمایش:

مصرف داروی وارفارین باید منظم و همراه با آزمایش مکرر و منظم خون باشد. تست آی-ان-آر (INR) نشان می دهد که زمان انعقاد خون شما چقدر طول می کشد و در افراد طبیعی که وارفارین مصرف نمی کنند، یک می باشد. جهت تنظیم دقیق دارو مقدار آی-ان-آر (INR) خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. پس از ۳ روز از شروع دارو، باید آزمایش آی-ان-آر (INR) و پی-تی (PT) یک مرتبه چک شود. ۳ روز بعد مجدد این آزمایشات تکرار می گردد و تا یک ماه به صورت هفتگی و بعد از آن، هر ماه یک مرتبه تکرار گردد. در صورتی که میزان آی-ان-آر (INR) بالای ۳ بود لازم است به پزشک مراجعه کنید.

دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸