


کاتتر دائم چیست ؟

- کاتتر تونلدارکه به آن «پرم کت» هم می گویند، یکی از راههای دسترسی به عروق جهت انجام همودیالیز (دیالیز خونی برای تصفیه خون) است.



- شکل ظاهری کاتترتونل دارلوله ای Yمانند(دوشاخه) به شکل بالا است که در سیاهرگ گردن(ورید ژوگولار) یا در موارد نادر در رگ کنار کشاله ران (ورید فمورال) و یا در ورید زیر استخوان ترقوه (ورید ساب کلاوین) قرار داده می شود.

- محل خروج کاتتر زیر پوست، ناحیه تونل ماندی ایجاد می کند که به صورت نوار برجسته ای در زیر پوست لمس می شود.



نکات مراقبتی هنگام تعویض پانسمان چیست؟

- پانسمان کاتتر بایستی با هر دیالیز تعویض شود و از نظر علائم عفونت کنترل گردد.
- پانسمان کاتتر فقط باید توسط پرسنل آموزش دیده تعویض گردد.
- در موقع استفاده از کاتتر بر روی محل خروجی بایستی یک لایه گاز استریل خشک قرار داده شود.
- موقع تعویض پانسمان بیمار و پرستار هر دو باید ماسک بزنند.
- برای ضد عفونی کردن و تعویض پانسمان کاتتر، از سرم نرمال سالین استفاده شود.
- هنگام پانسمان بر روی محل خروج کاتتر، پماد مویروسین گذاشته و با یک گاز خشک پوشانده شود.
- از گاز های کوچک و چسب های محکم برای ثابت کردن کاتتر استفاده کنید.



چه مدتی کاتتر نیاز به پانسمان دارد؟

ترمیم زخم محل خروج کاتتر و چسبندگی کاتتر به زیر پوست حداق ۱۵ روز و برای بیمارانی که دیابت دارند معمولا ۳۰ روز طول می کشد

علائم عفونت کاتتر چیست؟

- ضعف عمومی و بی حالی
- درد ناحیه خروج کتتر . لرز هنگام دیالیز
- ورم و حساسیت محل کاتتر
- قرمزی و ترشح موضعی از محل خروج کاتتر

سایر نکات مراقبتی در کاترتونل دار چیست؟

۱. درحفظ پانسمان کاتتر کوشا باشید و از ریختن غذا یا خیس شدن آن جلوگیری کنید.
۲. کاتتر را دستکاری نکنید. و روی سمت قرار گیری آن نخواستید
۳. از کشیده شدن به بیرون یا جابه جایی به داخل محافظت کنید.
۴. بیمار باید دقت کند هنگام تعویض لباس کاتتر کشیده نشود.
۵. در زمان اتصال و یا قطع از دستگاه دیالیز بیمار و پرستار هر دو باید ماسک بزنند.
۶. در هر نوبت دیالیز، پرستار بخش همودیالیز باید محل خروجی کاتتر را از نظر علائم عفونت، معاینه نماید و در صورت وجود عفونت به پزشک اطلاع دهد تا مراقبت و درمان آغاز شود.
۷. به دلیل خطر بروز عفونت و خونریزی، در فواصل بین نوبت های دیالیز، از طریق کاتتر هیچ گونه خونگیری، تزریق دارو و وصل سرم نباید انجام شود.




یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

مراقبت از کاتتر دائم [پرم کت] کد محتوا: ۳۰۱



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

بخیه های کاتتر چه زمانی باید کشیده شود؟

- بخیه های روی گردن، یک الی دو هفته بعد باید کشیده شود.
- بخیه های روی سینه زیر یک ماه کشیده نمی شود و بنابراین در صورت باز شدن نیاز به بخیه مجدد دارد. و بهتر است همیشه بخیه داشته باشد
- بخیه های روی سینه بعد از چسبندگی کامل کاتتر به زیر پوست با نظر پزشک خارج می شود که این زمان معمولاً بیش از یک ماه است

اگر دریچه های کاتتر باز شد یا افتاد چه باید کرد؟

بیمار و خانواده باید بدانند که اگر دریچه های کاتتر باز شد و یا افتاد، مجدداً نباید آن را استفاده کنند، بلکه بایستی هر چه سریع تر برای بستن دریچه کاتتر، به بخش دیالیز یا اورژانس مراجعه نمایند.

تا چه زمانی کاتتر می تواند در بدن باقی بماند و

برای دیالیز کار آیی داشته باشد؟

تعبیه کاتتر تونل دار برای بیمار فرصتی است جهت تعبیه فیستول شریانی وریدی و یا گرفت مصنوعی و رسیده شدن آن که مدت خون دهی این کاتترها در افراد مختلف متفاوت است و بدلیل عارضه های زیاد بیماران باید هر چه سریعتر جهت تعبیه فیستول و یا گرفت مصنوعی اقدام کنند

پدیدآورنده: معصومه قانع (کارشناس و پرستار آموزش دیالیز و مشکلات کلیوی) * مشاورین علمی: اساتید گروه نفرولوژی و

جراحی عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) طرح و تدوین: پروانه خراسانی "دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیئت علمی مشاور علمی: فرشته سلیمی" جراح عروق"

منبع Hand Book dialysis 2012

بروز رسانی خانم محمدی، خانم قانع "کارشناسان پرستاری" دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) مهر ۱۳۹۹

پاسخ به سوالات رایج شما:

آیا با این کاتتر می توانم به حمام بروم؟



بعد از ۳ تا ۴ روز می توانید حمام کنید ولی لازم است از پانسمن ضد آب بر روی محل خروجی کاتتر تا حد اکثر یک ماه استفاده کنید.



بعد از ترمیم محل خروج کاتتر، معمولاً یک ماه بعد از عمل، می توانید به طور معمول حمام بروید و نیازی به پانسمن بعد از حمام ندارید ولی باید از غوطه وری کاتتر در آب (مثل استخر رفتن، شنا کردن و خوابیدن در وان) خودداری کنید.