

درمان

لّه تاکی پنه خفیف اغلب طی ۴ ساعت اول پس از تولد، زمانی که باقی مانده مایع ریه باز جذب می‌شود بهبود می‌یابد.

لّه در تاکی پنه متوسط بهبودی معمولاً ظرف ۲ الی ۳ روز صورت می‌گیرد.

درمان‌های حمایتی شامل:

- اکسیژن تراپی از طریق کلاهک
- بررسی گازهای خون شربانی
- استفاده از مایع درمانی وریدی
- یا دادن شیر از راه لوله معده (گاواز)
- ایجاد محیط آرام و بدون حرک
- استفاده از آنتی بیوتیک

«با توجه به اینکه در این نوزادان احتمال ابتلا به عفونت نیز مطرح می‌باشد، ممکن است به مدت ۴۸ ساعت از آنتی بیوتیک هایی مانند آمپی سیلین، جنتامایسین و غیره استفاده شود.»

- حفظ دمای بدن نوزاد

لّه در تاکی پنه شدید یا عدم بهبودی ممکن است نوزاد به دستگاه تهویه با فشار ثابت (NCPAP) متصل شود.

علل تاکی پنه نوزادی

از علّی که در ایجاد تاکی پنه نوزادی دخالت دارند به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

- ❖ نوزادان رسیده (ترم) که با سزارین متولد شده اند.
- ❖ نوزادانی که با ضعف تنفسی متولد شده اند.
- ❖ جنس مذکر
- ❖ ماکروزوومی (جنین بزرگ)
- ❖ زایمان طول کشیده
- ❖ آسم و دیابت مادر
- ❖ نوزادان بالغ که مایع امنیوتیک و مکونیومی داشتند
- ❖ زایمان برعیج
- ❖ نوزاد مادر وابسته به مواد مخدر
- ❖ آپگار پایین

تشخیص

جهت تشخیص از اقدامات تشخیصی زیر استفاده می‌شود:

- ❖ سنجش اکسیژن خون
- ❖ عکس ساده قفسه سینه

تاکی پنه گذرای نوزادی

تاکی پنه به معنای تعداد تنفس بالا می‌باشد.

تاکی پنه گذرای نوزاد اختلال تنفسی ناشی از جذب دیرهنگام مایع زمان جنینی در ریه‌ها است.

این اختلال ممکن است با شروع زودهنگام تنדי تنفس همراه باشد.

گاهی با تو کشیدگی قفسه سینه
ناله در هنگام بازدم
پرش پره‌های بینی
و کبودی پوست همراه است؛
که ابتدا با مقدار کم اکسیژن،
و چند روز پس از تولد خود به خود برطرف می‌شود.



علائم

به دنبال بروز تاکی پنه زود گذر نوزادی علائم زیر در نوزادان مشاهده می‌شود:

تنفس سریع و زیاد به همراه تو کشیدگی قفسه سینه در هنگام دم که بلافاصله بعد از زایمان شروع می‌شود و ممکن است با سیانوز یا کبودی همراه باشد.

یامن اسمه دوائے و ذکر و شفاء



راهنمای بیمار

افزایش تعداد تنفس در نوزاد نارس (تاکی پنه گذرا)

کد محتوا: ۶۲۹



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

رژیم غذایی

- چون این نوزادان حرکات روده ای ضعیفی دارند،
تا بهبود وضعیت تنفسی، از راه دهان تغذیه نمی شوند.
+ با مایعات داخل وریدی تغذیه می شوند.
+ با دادن شیر از راه لوله تغذیه می شوند.



علائم هشدار جهت مراجعه به پزشک

- افزایش تعداد تنفس
- تو کشیدگی قفسه سینه در بازدم
- کبودی اندام ها
- پرش پره های بینی

پیگیری

چند روز پس از ترجیح حتماً به پزشک متخصص نوزادان جهت پیگیری درمان مراجعه کنید.

تهیه کننده: مینو عظیمی "کارشناس ارشد پرستاری کودکان"
مشاور علمی: دکتر اصغر لطفی "متخصص اطفال"
طراحی و تدوین: اکرم بیزدانی "کارشناس آموزش سلامت"
منبع: بیماری های نوزادان نلسون ۲۰۱۶، پرستاری بیماری های کودکان و نوجوان ۲۰۱۵، از: مستان ۱۳۹۸
بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) پاییز ۱۳۹۹

Ncpap

(دستگاه تهویه با فشار مثبت)

- | | |
|------------------------------------|---|
| بهبود اکسیژن رسانی | ✓ |
| بهبود بخشیدن به عملکرد ریه | ✓ |
| جلوگیری از بسته شدن حبابچه های ریه | ✓ |
| کاهش دفعات قطع تنفس | ✓ |



NCPAP

- | | |
|----------------------------------|---|
| کاهش تعداد تنفس | ✓ |
| تنفس منظم و از بین رفتن تنگی نفس | ✓ |
| برطرف شدن کبودی پوست | ✓ |

پیشگیری

- ✓ جهت پیشگیری از تاکی پنه گذرا در نوزادان، اقدامات درمانی زیر انجام می گردد.
- ✓ انجام سزارین بعد از هفته ۳۹ بارداری
- ✓ در صورت ضرورت انجام زایمان قبل از هفته ۳۹ بارداری، اقدام در جهت تسريع بلوغ جنین (تزریق بتامتاژون)
- ✓ ترک سیگار و الکل در دوران بارداری
- ✓ داشتن رژیم غذایی سالم در دوره بارداری