

تنگی مجرای ادراری در پسرها

مجرای ادراری لوله ایست که ادرار را از مثانه به بیرون هدایت می کند . انتهای مجرای ادراری مه آ یا مه آتوس نامیده می شود .

✚ تنگی مجرای ادراری عبارت است از تنگ

شدن محل خروج ادرار

✚ تقریبا همیشه تنگی مجرای ادرار پسران

اکتسابی بوده و به دنبال ختنه در

شیرخوارگی دیده می شود ولی می تواند

مادرزادی نیز باشد .

✚ یک سوم موارد ختنه شده دچار تنگی

مجرای ادراری می شوند. بصورت

شایع تر در زمانی که بچه پوشک می

شود این عارضه رخ می دهد .

تشخیص تنگی مجرا

✚ شرح حال و معاینه

✚ در معاینه تنگی سرمجرای ادرار دیده می شود.

علت تنگی مجرای ادراری

✚ آمونیاک ادرار و خیسی پوشاک پس از

ختنه باعث التهاب سر مجرای ادرار

شده و التهاب ایجاد شده باعث تنگی

مجرای ادراری می شود.

اشکال تکنیکی در انجام ختنه و قطع

شریان خونسازان نوک مجرای ادراری

منجر به تنگی تروما یا آسیب دیدن مجرای

ادراری می شود.

علائم تنگی مجرای ادراری

✚ جریان ادراری پرسرعت و باریک

✚ انحراف جریان ادراری به سمت بالا

✚ کجی ادرار

✚ طول کشیدن مدت تخلیه ادرار

✚ پاشیدن ادرار

✚ درد آلت در شروع ادرار

✚ زورزدن برای ادرار کردن

✚ خونریزی در پایان ادرار کردن

بصورت یک قطره خون برروی سر

مجرای ادرار

✚ بی اختیاری ادراری

✚ سوزش سر مجرای ادرار

✚ باقی ماندن ادرار در مثانه پس از تخلیه ادرار

عوارض تنگی مجرا

✚ عفونت ادراری مداوم :

✚ (که با آزمایش ادرار و کشت ادرار مشخص

می شود).

✚ برگشت ادرار به کلیه ها :

✚ (که با سونوگرافی کلیه ها و مثانه مشخص

می شود).

✚ نارسایی کلیه





یا من اسمہ دوائے و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار تنگی مجرای ادرار پسران

کد محتوا: ۱۹۹




<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

تنگی مجرای ادرار طبیعی



ادرار



تهیه کننده: زینب کیانی "کارشناس پرستاری"

منبع: کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ ۲۰۱۵

مشاور علمی: دکتر جزینی "فوق تخصص جراحی اطفال"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) شهرریور ۱۳۹۹



درمان تنگی مجرا

درمان تنگی مجرای ادراری عمل جراحی می باشد که در این تکنیک مجرا برش داده می شود و به سایز و اندازه نرمال می رسد.

پیشگیری از تنگی مجرای

ادراری به دنبال ختنه

(۱) ختنه حتما توسط یک فرد مجرب انجام شود .

(۲) تا وقتی که کودک پوشک است برای اجتناب از التهاب هنگام تعویض پوشک

الف) باید نوک مجرا چرب شود .

ب) تعویض مکرر پوشک

ج) مصرف شیر و مایعات

