

❖ پورت کت چیست؟

وسیله‌ای است که توسط یک جراح در اتاق عمل در جلوی قفسه سینه در یک رگ مرکزی به منظور انجام تزریقات مکرر قرار داده می‌شود.



پورت کت

❖ پورت کت در چه افرادی قابل استفاده

میباشد؟


- + در کسانی که به مدت طولانی از آنتی بیوتیک‌های قوی استفاده می‌نمایند.
- + کسانی که از داروهای شیمی درمانی استفاده می‌کنند.
- + کسانی که سابقه‌ی تزریق مکرر خون دارند. "مانند بیماران تالاسمی"
- + کسانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند.

❖ پورت کت تا چه زمانی قابل نگهداری است؟

- + تا زمانی که علائم عفونت را نداشته باشد و عملکرد پورت برقرار باشد طبق تشخیص پزشک در بدن باقی می‌ماند.

❖ محل‌های قرارگیری پورت کت کجاست؟

- ✓ در جلوی قفسه‌ی سینه در یک رگ مرکزی
- ✓ گاهی در بازو و شکم هم قرار داده می‌شود.



❖ نحوه‌ی تزریق با سر سوزن مخصوص

پورت چگونه می‌باشد؟

برای تزریق از سرسوزن‌های مخصوص که نوک آن کج می‌باشد و به سرسوزن هابر معروف است استفاده می‌شود. این نوع سر سوزن در داروخانه‌ها در اندازه‌های مختلف موجود است.



- ✓ ابتدا دست خود را با آب و صابون بشویید.
- ✓ سپس دستکش تمیز پوشیده و محل پورت را ضدعفونی نمایید.

✓ قبل از تزریق دارو محل پورت را با ۲۰ سی سی "برابر با چهار عدد آب مقطر" بشویید.


✓ سپس با سرنگ ۲۰ سی سی آب مقطر تزریق شده در پورت را به بیرون بکشید و برگشت خون به داخل سرنگ را مشاهده نمایید.

✓ با دو انگشت محل تزریق را بگیرید تا ثابت بماند سپس به صورت عمودی سوزنی را که انتخاب کرده- اید در آن فرو کنید تا به مانع محکمی که در انتهای محفظه قرار دارد برخورد کند. آن موقع می‌توانید دارو را تزریق کنید.

✓ پس از تزریق دارو ۲۰ سی سی آب مقطر تزریق کرده و محلول هپارین (داروی جلوگیری از بسته و لخته شدن پورت کت) طبق دستور پزشک تزریق نمایید.

❖ پورت بعد از قرارگیری در بدن چه زمانی قابل استفاده می‌باشد؟

سه روز بعد از عمل قابل استفاده می‌باشد.





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار خود مراقبتی از پورت کت

کد محتوا : ۴۲۳



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

❖ در صورت مشاهدهی علائم زیر به

پزشک خود مراجعه کنید:

- ✓ افزایش درجهی حرارت بدن "تب"
- ✓ قرمزی محل پورت
- ✓ تورم محل پورت
- ✓ درد شدید محل پورت
- ✓ عدم بازگشت خون از پورت

تهیه کننده : گلچهره اندیش "کارشناس پرستاری"

مشاور علمی: دکتر عباس ساروخانی "متخصص جراحی عروق"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

منبع: دانشنامه تخصصی جراحی ۱۳۹۸ درسنامه داخلی جراحی برونر

سودارت ۲۰۱۸

دفتر آموزش سلامت الزهرا(س)

بروز رسانی اردیبهشت ۱۳۹۹



❖ بعد از عمل جراحی چه مراقبت‌هایی

لازم است؟

- ✓ می‌توان پانسمان را بعد از ۴۸ ساعت (دو روز) برداشت.
- ✓ بعد از برداشت پانسمان می‌توانید دوش بگیرید.
- ✓ بعد از جراحی قادر به رانندگی نیستید، بنابراین باید از شخص دیگری بخواهید شما را تا منزل برساند.
- ✓ در صورت وجود درد طبق نظر پزشک معالج از یک قرص مسکن استفاده کنید.

❖ در صورت مشاهدهی این علائم

- ✓ درد و ناراحتی در هنگام تزریق
- ✓ قرمزی و تورم محل تزریق
- ✓ عدم بازگشت خون از پورت
- ✓ تب

✓ **نباید در پورت تزریق انجام شود.**

