

ایجاد یک برش در دیواره ی شکم جهت ورود به حفره شکم به منظور اکتشاف، تشخیص و درمان احتمالی می باشد. لاپاراتومی اکتشافی در صورتی انجام می شود که جراح نتواند با روش های دیگر به تشخیص قطعی در مورد وضعیت بیمار برسد.

موارد کاربرد لاپاراتومی

برخی از شرایط که به ایجاد لاپاراتومی می انجامد عبارتند از:

۱. سرطان های ارگان های شکمی
۲. التهاب صفاق، پوشش حفره شکمی
۳. التهاب آپاندیس
۴. التهاب لوزالمعده
۵. آبسه شکمی
۶. چسبندگی (پس از ضربه یا جراحی)
۷. التهاب سازه های کیسه مانند در دیواره روده ها (دیورتیکولیت)
۸. سوراخ یا انسداد روده
۹. حاملگی خارج رحمی
۱۰. اجسام خارجی (مانند وجود گلوله)
۱۱. خونریزی داخلی فضا های در دسترس

فضاهای دسترسی

عمل جراحی لاپاراتومی بسته به نوع برش ایجاد شده باعث دسترسی به ارگان های مختلف شکمی میشوند از جمله:

- اندام های دستگاه گوارش (معده، قسمت های مختلف روده باریک، آپاندیس و قسمت ابتدایی روده بزرگ)
- اندام های تناسلی زنان (رحم و تخمدان)
- اندام های پشت صفاقی (کلیه، سرخرگ آئورت پایین رو، غدد لنفاوی شکم)
- مثانه

اقدامات قبل از عمل جراحی

- انجام آزمایشات و عکس برداری های مورد نیاز
- تراشیدن موهای ناحیه عمل
- خارج کردن زیورآلات و دندان های مصنوعی
- مایع و دارو درمانی (آنتی بیوتیک های پیش گیرانه)
- عدم مصرف غذا و آشامیدن (حداقل ۸ ساعت قبل عمل)
- گرفتن خط وریدی برای تامین مایعات و داروها
- تعبیه سوند ادراری

مراقبت های بعد از جراحی

- تا زمانی که اثر داروهای بیهوشی از بین نرفته خوردن و آشامیدن ممنوع است اما بعد از آن بیمار می تواند با اجازه پزشک از مقادیر کم رژیم مایعات استفاده و در صورت تحمل رژیم مقادیر آن را افزایش دهد.
- بیمار باید به زودی از تخت پایین بیاید در اطراف خود راه رفته زیرا این کار از ایجاد لخته خون جلوگیری می کند.
- هم چنین برای حفاظت از ریه ها لازم است تنفس عمیق انجام دهد.
- مصرف داروهای تجویز شده (جهت جلوگیری از عفونت و مدیریت درد) بدرستی انجام شود.
- در عرض چند روز آتی سوند ادراری و درن (لوله ای که جهت خروج ترشحات در محل جراحی قرار گرفته است) خارج می شود
- تاریخ کشیده شدن بخیه ها بسته به نظر پزشک و نوع عمل از یک هفته تا ده روز طول می کشد.
- در صورت نداشتن درن محدودیتی برای استحمام از روز بعد از عمل وجود ندارد اما در صورت داشتن درن تا زمان خروج درن استحمام نکنید.



یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء

راهنمای بیمار

لاپاراتومی (جراحی حفره شکم)

کد محتوا: ۵۸۳

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

روشهای جایگزین جراحی شکم

لاپاراسکوپی یک جایگزین نسبتاً مناسب برای لاپاراتومی است که دارای مزایای بسیاری میباشد. لاپاراسکوپی یک روش جراحی است که در آن یک لاپاراسکوپ و دیگر ابزارهای جراحی از طریق برش های کوچک وارد شکم میشوند، فضای داخل شکم و مراحل انجام عمل در نمایشگر نشان داده میشود. لاپاراسکوپی با حداقل تهاجم است، بنابراین بهبودی سریعتر، زخم جراحی کوچکتر و با عوارض کمتری جهت بیمار می باشد.

تهیه کننده: فهیمه صادقی "کارشناس مامایی"
منبع: درسنامه نواک واسپروف ۲۰۱۸
مشاور علمی: فهیمه ثابت "جراح و متخصص زنان و زایمان"
طراحی و تنظیم: دفتر آموزش سلامت الزهرا (س)
"آذر ۱۴۰۱"

- به مدت یکسال از انجام کارهای سنگین بپرهیزید.
- اگر زخم باز باشد طبق نظر پزشک روزی ۲ بار با سرم نرمال سالین شست و شو داده و پانسمان مرطوب بگذارید.
- زخم بعد از ۳ تا ۴ روز در اتاق عمل بسته میشود
- زمان بهبودی برای هر فرد متفاوت است و ممکن است ۴ تا ۶ هفته طول بکشد.
- درمورد زمان مراجعه بعدی از پزشک سوال کنید

شایع ترین خطرات و عوارض احتمالی جراحی لاپاراتومی

۱. خونریزی
۲. عفونت
۳. بهبود ضعیف برش
۴. خسارت، آسیب، یا مشکلات روده
۵. خطرات بیهوشی

