

موقعیت لوزالمعده (پانکراس) در بدن

پانکراس (لوزالمعده) ارگانی است که پشت معده قرار دارد.



وظیفه پانکراس ترشح هورمون و شیرهای گوارشی برای کمک به هضم غذا میباشد .

سرطان پانکراس

شایع ترین سرطان ، سرطان قسمت برون ریز پانکراس اگزوکربین است که از مجاری پانکراس نشأت میگیرد .



نوع دیگر سرطان ، از گروهی از تومورها با منشأ سلول های سازنده هورمون هائی مثل انسولین تشکیل میشود . این تومورها ، تومورهای درون ریز پانکراس نام دارند .

مراحل پیشرفت سرطان لوزالمعده

مرحله بندی روشی است که برای تعیین میزان تهاجم و گسترش سرطان استفاده میشود .

گستره مراحل سرطان پانکراس از مرحله یک ، که پائین ترین مرحله است تا مرحله 4 که در این مرحله سرطان به اندام های دور از پانکراس مانند مغز گسترش یافته است . در کل مراحل پائین تر سرطان کمتر مهاجم هستند و به درمان های کمتری نسبت به مراحل بالا نیاز دارد .

درمان سرطان پانکراس

✚ میتوان سرطان پانکراس را به روش های مختلفی درمان کرد .

✚ مراحل پائین سرطان پانکراس را میتوان با جراحی درمان یا معمولاً بعد از جراحی ،

✚ توصیه به انجام درمان های بعدی که درمان های تکمیلی نام دارند میشود . این درمان ها شامل شیمی درمانی و رادیو تراپی (پرتودرمانی) میشود .

✚ در بعضی از افراد شیمی درمانی یا رادیو تراپی قبل از جراحی و به عنوان درمان های اولیه تجویز میگردد .

✚ هرچند بیشتر اوقات به خاطر پیشرفته بودن سرطان پانکراس به هنگام تشخیص ، جراحی ممکن نمی باشد . در این صورت از رادیو تراپی یا شیمی درمانی یا هر دو با هم به منظور کوچک کردن تومور ، کاهش علائم و افزایش طول عمر استفاده میشود


جراحی تومورهای سر پانکراس

فرایند ویپل روش استاندارد جراحی تومورهای سر پانکراس میباشد (در این جراحی سر پانکراس و اول روده باریک برداشته میشود.

در این روش ممکن است جراح ، سر پانکراس ، اولین قسمت روده باریک ، قسمتی از ژژنوم (قسمت بعدی روده باریک) ،

مجرای صفراوی مشترک ، کیسه صفرا و قسمتی از

امروزه بیشتر از روش تصحیح شده ویپل (حفظ دریچه معده در روش ویپل) استفاده میشود که قسمت پیلوز (دریچه) معده که نقش مهمی در تخلیه معده دارد ، حفظ میشود .





یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

مراقبت در جراحی لوزالمعده

(ویپل)

کد محتوا: 135

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: Salamat@azh.mui.ac.ir

با پرستار در کنترل علائم حیاتی ، میزان ادرار و ترشحات از دیگر لوله ها همکاری کنید .

جهت درد دارو داده میشود که به شما در سرفه کردن و تنفس عمیق و وضعیت بدنی کمک می کند . مقدار و زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد .

رژیم مایعات از سه الی پنج روز بعد شروع میشود و از راه ژژنوستومی هم تغذیه داده میشود .

پانسمان هر روز و در طول روز هم در صورت نیاز تعویض میشود .

سوند ادراری سه تا چهار روز بعد خارج میشود .

لوله معده تا شروع مایعات باقی می ماند و در زمان شروع رژیم مایعات خارج میشود .

درنجا حدود یک هفته می مانند سپس خارج میشوند 48 ساعت پس از خروج درنجا می توانید حمام کنید .

ژژنوستومی تا زمان ترخیص و رفتن به منزل می ماند.

بخیه ها ده الی دوازده روز بعد کشیده میشود .

وزن شما در زمان بستری و در منزل نیز باید کنترل شود .

بعد از جراحی احساس ضعف و خستگی به شما دست میدهد که در حدود یک ماه در منزل باید استراحت کنید .

بعد از شروع رژیم مایعات به تدریج رژیم جامد اضافه میشود .

توجه : برای راهنمایی تغذیه از طبق ژژنوستومی از پمفت آن استفاده نمایید .

گردآورنده : شهلا رئیسی ، فخری فرازمنند "کارشناس پرستاری"
مشاور علمی : دکتر کلیدری ، متخصص جراحی
طراحی و تدوین : محمود نصرافیهانی "سوپر وایزآموزش سلامت"



جراحی تومورهای بدنه و دم پانکراس

تومورهای بدنه و دم پانکراس علائمی مشابه تومورهای سر پانکراس را ایجاد نمی کند در نتیجه این سرطان در مراحل بالاتری و وقتی که پیشرفته است علامت میدهد. اگر تومور قابل جراحی باشد ، قبل از جراحی ، یک لاپاروسکوپی برای اطمینان از اینکه تومور به خارج از پانکراس گسترش نداده است انجام میشود . در صورت انجام جراحی ، قسمتی از پانکراس همراه با طحال برداشته میشود

مراقبت قبل از عمل جراحی

روز قبل از عمل حمام کنید .

محل عمل کاملاً باید خالی از مو شود .

از 8 ساعت قبل از عمل معمولاً از ساعت 12 شب چیزی نخورید .

مراقبت بعد از عمل جراحی

معمولاً لوله هائی به عنوان ژژنوستومی (لوله درون قسمتی از روده) و لوله معده و سوند ادراری و درن گذاشته میشود . روی شکم شما تعدادی بخیه نیز میباشد .

روز بعد از عمل در وضعیت نیمه نشسته قرار بگیرید که کمک به اتساع ریه می کند و فشار بر بخیه ها را کاهش می دهد .

لوله معده از داخل بینی وارد شده که ترشحات معده را تخلیه و فشار روی بخیه های را کاهش می دهد .

روز بعد از عمل پزشک اجازه خارج شدن از تخت و راه رفتن را می دهد .

تنفس عمیق و سرفه موثر ترشحات را خارج میسازد و لوله هی کوچک تنفسی را باز میشود .

در هنگام تنفس عمیق و سرفه کردن محل برش را بگیرید .

