



یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء

کد: ۶۴۸

داروی پلاویکس

- نام دیگر: کلوپیدوگرل یا اسویکس
- شکل ظاهری: قرص های ۷۵ میلی گرمی روکش دار، صورتی رنگ
- موارد مصرف: داروی پیشگیری ایجاد لخته بعد از سکته قلبی و مغزی پس از گذاشتن فنر
- روش مصرف: معمولاً پس از آنژیوگرافی، دو قرص روزانه تا یک هفته الی ده روز و سپس یک قرص روزانه تا یک سال (بسته به نظر پزشک)
- اگر یکبار خوردن قرص را فراموش کردید اگر از زمان خوردن بیش از ۱۲ ساعت گذشته باشد آن را مصرف نکنید.
- در صورت داشتن موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:
 - مدفوع خونی یا قیری، ادرار خونی، تجمع خون زیر پوست، خونریزی بینی، تب، خستگی، زردی، نقاط ریز قرمز زیر پوست، دانه های پوستی و خارش و تاول (حساسیت به دارو)، تاخیر درلخته شدن خون
 - پوشش بیمه پلاویکس با قیمت دولتی تا یک سال: با نسخه نوشته شده، گزارش آنژیوگرافی به بیمه مربوطه (سلامت یا تامین اجتماعی) و سپس تایید، دارو را از داروخانه تهیه کنید.

دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۰۸