

## داروی Influxmab (ریمکید)

داروی ساخته شده از پروتئین موش (ساخت آمریکا) تزریق این دارو برای از بین بردن علائم برخی از بیماریها مثل :

- روماتیسم مفصلی
- کرون (زخم غشاء دستگاه گوارش)
- کولیت اولسرا (زخم روده بزرگ)
- اسپوندیلیت آنکیلوزان (التهاب مفاصل ستون فقرات)
- بعضی از بیماریهای پوستی و ورم مفاصل استفاده می شود.

## هشدار

تزریق این دارو ممکن است توانایی شما را برای مبارزه با عفونت ها کاهش دهد.

بنابر این اگر شما داروهایی مثل متوترکسات، آمپول میتل پرونیزولون - دگزامتازون یا داروهای شل کننده خون مثل آسپرین و وارفارین، داروهای ریوی تنفسی مثل تتوفیلین مصرف میکنید باید پزشک خود را مطلع کنید.

اگر مبتلا به سل (عفونت شدید ریه) - هپاتیت B (یک ویروس که کبد را تحت تأثیر قرار می دهد)

یا دچار نارسایی قلبی، بیماری M.S، گیلن باره (فلج و آسیب ناگهانی اعصاب)، التهاب بینایی یا آسم هستید یا هر نوع سرطان که دارید باید پزشک معالج خود را مطلع سازید.



اگر باردار هستید یا بچه شیر می دهید یا برای انجام واکسیناسیون و یا اگر نیاز به عمل جراحی مخصوصاً جراحی دندان دارید با پزشک خود مشورت کنید.

## عوارض جانبی ناشی از مصرف داروی ریمکید

- درد قسمت بالای معده - سوزش معده - تهوع - بی اشتهایی
- سردرد - آبریزش بینی
- کمردرد - تورم پاها - ضعف در بازوها و ساق پاها
- وجود تکه های سفید رنگی در دهان - خارش واژن - سوزن و درد - گر گرفتگی
- درد قفسه سینه - تنگی نفس
- افزایش وزن ناگهانی - بی حسی یا سوزن سوزن شدن در هر بخش از بدن
- تشنج
- زردی پوست یا چشم ها - تاری دید و یا تغییرات بینایی
- تیره شدن ادرار - خون در مدفوع این واکنشها بین ۳ تا ۱۲ روز پس از تزریق ریمکید ممکن است بروز کند
- پوست رنگ پریده



## روشی استفاده

ویال ریمکید در روز 100 mg وجود دارد. روش حل کردن آن به این صورت است که با 10 cc آب مقطر حل شود.

از تکان دادن ویال خودداری کنید و به صورت داخل وریدی (داخل رگ ورید) توسط یک پزشک یا پرستار در مطب یا مراکز درمانی تزریق شود. تا ۸ هفته یک بار در هفته تزریق شود و کمتر بیش از این ادامه می یابد.

مدت تزریق دارو حدود ۲ ساعت طول می کشد حتماً باید با سرم از نوع نمکی رقیق شود و با ست سرم فیلتردار تزریق شود.

داروهای دیگری برای درمان یا جلوگیری از واکنش ها نسبت به تزریق (ریمکید) Influxmab که توسط پزشک یا پرستار بلافاصله پس از مشاهده علائم زیر در طول تزریق یا قبل از تزریق یا پس از تزریق تجویز می شود شامل آمپول هیدروکورتیزون - آمپول کلرفینرامین

مدت تزریق دارو حدود ۲ ساعت طول می کشد حتماً باید با سرم از نوع نمکی رقیق شود و با ست سرم فیلتردار تزریق شود.





یا من اسم دواء و ذکره شفاء



راهنمای بیمار

INFLXMED

(ریمکید)

کد محتوا: ۵۱۷



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: [Salamat@azh.mui.ac.ir](mailto:Salamat@azh.mui.ac.ir)

## آمپول کلرفینرامین

کلرفینرامین یکی از رایج ترین داروهای ضد حساسیت است. بیشترین کاربرد کلرفینرامین در بیماری موسوم به رینیت (التهاب مزمن بینی یا التهاب غشاهای مخاطی بینی) سرماخوردگی، آلرژی و کهیر است. این دارو در ترکیب بسیاری از داروهای رایج سرماخوردگی مانند قرص سرماخوردگی بزرگسالان وجود دارد.

### نکات قابل توجه

- ✚ مصرف کلرفینرامین در حمله های آسم، بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی و دوران شیردهی ممنوع است
- ✚ استفاده همزمان این دارو با فنی توین می تواند منجر به افزایش اثرات فارماکولوژیکی فنی توین شود.
- ✚ مصرف همزمان کلرفینرامین با الکل و مواد خواب آور و آرام بخش موجب تضعیف دستگاه عصبی بدن می شود

تهیه کننده : مهین مسعودیان

مشاور علمی :

طراحی و تدوین : مریم اقتداری "کارشناس آموزش سلامت"



## آمپول هیدروکورتیزون - آمپول

### کلرفینرامین

تزریق Infixmab ممکن است واکنش های حساسیتی (آلرژیک) جدی در طول تزریق و یا به مدت ۲ ساعت بعد از آن داشته باشد که باید در حین تزریق تحت نظارت پزشک یا پرستار باشید ممکن است پزشک برای درمان واکنش آلرژیک از داروهای زیر استفاده کند .

### آمپول هیدروکورتیزون

درمان واکنش های آلرژیک  
درمان لوکمیا و لنفوم (بدخیمی های خونی)

### نکات قابل توجه

- ✦ از مصرف خودسرانه این دارو خودداری کنید .
- ✦ از بکار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه تحت درمان با هیدروکورتیزون خودداری شود.
- ✦ از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود.
- ✦ در صورتی که با گذشت دو هفته عارضه ای که برای آن هیدروکورتیزون تجویز شده، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد، به پزشک مراجعه شود.

