

اشکال دارویی ایمونو گلوبولین

(IVIG) آی وی آی جی

- به صورت ویالهای ۵ گرمی و محلول است.
- یا ساندوگلوبولین که ۶ گرمی است و همراه با حلال خود می باشد.
- در هنگام مصرف باید کنترل کنید که تیره نباشد و یا ذرات معلق نداشته باشد.



موارد مصرف

به منظور جلوگیری از عفونت ها و تأمین یک ایمنی غیرفعال توصیه می شود. درمان هر ۳-۴ هفته یکبار داده می شود

- در بیماریهای نقص ایمنی اولیه
- فقدان و یا کمبود مادرزادی گاما گلوبولین خون
- بیماری نقص سیستم ایمنی اکتسابی مثل کاوازاکی
- بعضی از بیماریهای اعصاب مثل گیلن باره
- بعضی از بیماری های روماتوئیدی

شرایط نگهداری

- دارو در جعبه خود نگهداری شود و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
- از یخ زدگی جلوگیری شود و زنجیره سرما رعایت شود.
- شماره سریال و تاریخ انقضا کاملاً کنترل شود.
- پس از برداشتن سرپوش دارو به خاطر جلوگیری از آلوده شدن و عفونت بلافاصله استفاده شود.

روش مصرف دارو

- قبل از مصرف باید دمای دارو به دمای اتاق یا دمای بدن برسد.
- کنترل دفع ادرار - کنترل سطح کراتین خون
- پرهیز از مصرف املاح معدنی
- بیمار در یک ساعت اول تزریق دارو از نظر علائم حساسیت کنترل شود.
- در یک ساعت اول سرعت تزریق به دقت کنترل و علائم حیاتی بیمار را ثبت کنید.

موارد منع مصرف

- بیمارانی که حساسیت به این دارو دارند
- بیمارانی اختلالات عروقی دارند، مثل بیمارانی دارای دیابت و یا افراد بیماری برگ
- در بیمارانی که نارسایی کلیه دارند عوارض جانبی شایعتر است.

عوارض حین تزریق دارو

- ممکن است بیمار به این دارو حساسیت نشان دهد
- ممکن است علت برخی از عوارض جانبی شدید این دارو سرعت تزریق دارو باشد

علائم حساسیت

- تب و لرز - کهیر
- تهوع - استفراغ
- کمر درد - دردهای
- تنگی نفس، سرفه
- کاهش فشارخون

در صورت مشاهده علائم حساسیت سریعاً دارو قطع شود و به پرستار یا پزشک اطلاع داده شود.

عوارض خیلی نادر

- سکته قلبی
- سکته مغزی
- لخته شدن خود در عروق بزرگ (آمبولی)
- در دوران بارداری و شیردهی با احتیاطهای لازم تجویز می گردد.
- این دارو ممکن است اثربخشی واکسن زنده ضعیف شده (مثل سرخک - سرخچه - اوریون یا آبله مرغان را کاهش بدهد)



یا من اسم دواء و ذکره شفاء



راهنمای بیمار

آمپول ایمونوگلوبولین (IVIG)

کد محتوا: ۵۱۴



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

❖ پرستار شما را درباره چگونگی دور انداختن سرنگ‌ها، سوزن‌ها و ظرف حاوی دارو شما را راهنمایی می‌کنند تا با صدمات احتمالی مواجه نشوید.

❖ سوزن و شیشه داروهای استفاده شده را در ظروف مخصوص (سیفتی باکس) بریزید.
اگر دارو را درون رگ یا زیر پوست خود دریافت می‌کنید در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک اطلاع دهید .

■ گرم شدن

■ حساس شدن

■ خشکی

■ قرمزی

■ ورم

■ درد

تهیه کننده : عفت زارعی "کارشناس پرستاری"
مشاور علمی : دکتر ثالی "فوق تخصص روماتولوژی"
طراحی و تدوین : محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) آذر ماه ۱۴۰۰



هشدار مهم

❖ اگر یکی از داروهای نظیر آمیکاسین، جنتاماسین استرپتوماسین یا سایر داروهای که باعث آسیب‌های کلیوی می‌شود استفاده می‌کنید حتماً پزشک خود را در جریان بگذارید.

❖ اگر کاهش ادرار و افزایش ناگهانی ورم پا- یا قوزک پا و تنگی نفس احساس کردید فوراً پزشک و یا پرستار را در جریان بگذارید.

❖ داروخانه ممکن است ذخیره یک روزه را طی یک نوبت به شما بدهد شما آن را در یخچال نگه دارید و پیش از مصرف دارو آن را یک ساعت قبل از استفاده از یخچال بیرون و در مکان خشک و پاکیزه بگذارید تا دمای آن با دمای اتاق یکسان شود.

