

کاتتر موقت (اکسس) چیست ؟

کاتتر موقت یک لوله Y شکل (دو شاخه ی) پلاستیکی برای انجام دیالیز خونی می باشد.
اکسس معمولا در یک سیاهرگ بزرگ مثل سیاهرگ کنار گردن و یا سیاهرگ کنار کشاله ران برای مدت کوتاه (یک تا چند هفته) گذاشته می شود.



مراقبت از کاتتر موقت چگونه است؟

- تعویض پانسمان کاتتر تنها باید توسط پرسنل آموزش دیده صورت گیرد .
- در هر نوبت دیالیز محل خروجی کاتتر باید از نظر علائم عفونت معاینه شود.

در صورت مشاهده علائم عفونت هرچه سریع تر به پزشک یا بخش مراجعه کنید:

علائم عفونت کاتتر عبارتند از :

- * تب
- * درد
- * تورم
- * قرمزی
- * گرم بودن
- * خروج ترشح از محل ورود کاتتر

- بعد از هر بار دیالیز و استفاده از کاتتر، بایستی پانسمان تعویض و بر روی محل خروجی کاتتر پماد موپیروسین یا بتادین گذاشته و با یک گاز خشک پوشانده شود.



- از خیس شدن پانسمان کاتتر جلوگیری کنید.
- به کاتتر دست نزید و آن را به داخل یا بیرون نکشید.
- در حفظ پانسمان کاتتر کوشا باشید، این کاتتر همیشه نیاز به پانسمان دارد.
- در صورتی که کاتتر بطور اتفاقی خارج شد، محل آن را با پارچه استریل یا تمیز به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برای جلوگیری از خونریزی به آرامی فشار دهید و به نزدیک ترین مرکز پزشکی مراجعه کنید.

- در زمان اتصال یا قطع کاتتر از دستگاه دیالیز و نیز در موقع تعویض پانسمان، بیمار و پرستار هر دو باید ماسک بزنند.



- لوله های کاتتر باید استریل نگه داشته شود .
- بیمار باید دقت کند که در هنگام تعویض لباس کاتتر کشیده نشود.
- خونگیری، تزریق دارو، خون و و صل سرم در فواصل بین نوبت های دیالیز از طریق کاتتر ممنوع می باشد.
- کاتتر تا چه زمانی در بدن قابل استفاده می باشد؟**
- در صورت داشتن خون دهی مناسب، کاتتر در رگ کنار گردن ۳ تا ۴ هفته قابلیت استفاده دارد.
- در صورت داشتن خون دهی مناسب؛ کاتتر در رگ کنار کشاله ران تا یک هفته قابلیت دارد.
- زمان استفاده با نظر پزشک ممکن است تغییر کند.



یا من اسمہ دوائ و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار مراقبت از کاتتر موقت همودیالیز (اکسس) کد محتوا: ۳۰۳




<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a. Salamat@azh.mui.ac.ir

آیا بخیه های کاتتر باید کشیده شود؟

تا موقع وجود کاتتر در بدن، مواظب بخیه های کاتتر باشید که باز نشود و در صورت شل یا باز شدن بخیه ها، سریعاً به مرکز درمانی مراجعه تا مجدداً بخیه شود.



پدیدآورنده: معصومه قانع (کارشناس پرستاری مربی کشوری همودیالیز -

پرستار آموزش در مشکلات کلیوی و همودیالیز)

مشاورین: اساتید گروه نفرولوژی و جراحی عروق دانشکده

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منبع: Hand Book Diaalysis 2012

طرح و تدوین: پروانه خراسانی "دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیئت

علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان" (مسئول پروژه NEARER گسترش

نقش آموزش پرستاران بیمارستان الزهرا (س))

بروز رسانی نسرين محمدی، معصومه قانع "کارشناس

پرستاری" شهریور ۱۳۹۹


آیا با این کاتتر می توانم حمام بروم؟

با کاتتر موقت نمی توانید حمام بروید.

باید بدانید که:

- اگر دریچه های کاتتر باز و جدا شد، مجدداً آن را استفاده نکنید. فوراً به دیالیز یا اورژانس برای بستن دریچه کاتتر بطور استریل مراجعه کنید.
- از خم کردن کاتتر جلوگیری کنید.

در صورتی که کاتتر در رگ کنار گردن قرار دارد با یک باند به سر تان ثابت شود تا از خم شدن آن جلوگیری شود.



در صورتی که کاتتر در رگ کنار کشاله ران است روی ران پا با چسب محکم شود تا از خم شدن آن جلوگیری شود.