



باسم (سمه وولم و وکره شغل

کد: ۵۵۱

خود مراقبتی دارویی: آکاربوز

موارد مصرف: این دارو از تبدیل قندهای پیچیده به ساده در روده جلوگیری می کنند. در نتیجه سرعت افزایش قند خون بعد از غذا را کاهش می دهند..

موارد منع مصرف: در شیردهی مصرف نکنید

نحوه مصرف: نیم ساعت قبل از غذا مصرف کنید در صورتی که دچار عوارض جانبی این دارویی شوید آن را با اولین لقمه غذا مصرف کنید

توصیه به بیمار: در صورت بروز افت قند خون باید دکستروز (نه ساکاروز) خوراکی استفاده کنید و در موارد شدید ممکن است به آمپول گلوکاگون یا انفوزیون گلوکز نیاز پیدا کنید.

تداخل مهم دارو: اگر این دارو را همراه انسولین یا سولفونیل اوره ها (گلی پیزاید - گلی بوراید - گلی گلازید و گلی پیراید) مصرف کنید باعث افت قند خون می شود ولی به تنهایی موجب افت قند خون نمی شود بنابراین در صورت مصرف همزمان با داروهای دیگر کاهنده قند خون به علائم افت قند توجه کنید

گروه مراقبت دارویی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)