

جم فیروزیل (Lopid) (لوپید)

داروئی است که برای پائین آوردن تری گلیسرید و به صورت قرص ۴۵۰ میلی گرمی و کپسول ۳۰۰ میلی گرمی موجود است



- ❖ جم فیروزیل باید ۳۰ دقیقه پیش از صبحانه و شام خورده شود
- ❖ با شروع مصرف این دارو ممکن است برخی علائم گوارشی مانند اسهال ، نفخ ، یبوست ، سوزش سر دل روی دهد که معمولاً بعد از مدتی بهبود می یابند .
- ❖ در صورت بروز هر یک از علائم زیر مصرف جم فیروزیل را قطع کرده با پزشکتان مشورت کنید :
- ♣ دل درد شدید همراه با تهوع و استفراغ ، درد عضلانی یا خستگی غیر عادی ، سرفه ، تب یا لرز ، کمر درد .

در صورت وجود هر یک از موارد زیر پیش از مصرف جم فیروزیل پزشکتان را مطلع سازید

- ✚ حساسیت به جم فیروزیل
- ✚ بارداری یا شیردهی
- ✚ مصرف داروهای دیگر ، به ویژه لووستاتین یا ضد انعقادهای خوراکی مثل وارفارین
- ✚ سابقه یا ابتلا کنونی به مشکلات کیسه صفرا ، سنگ کیسه صفرا یا بیماریهای کلیوی یا کبدی .
- ✚ اگر ظرف ۳ ماه درمان با این دارو پاسخی مشاهده نشود ، پزشک معمولاً دارو را قطع می کند .

پیش از هر گونه جراحی و نیز کارهای دندان پزشکی ، پزشک را از این که این دارو را مصرف می کنید مطلع سازید

فنوفیبرات (Trirole) (تریرول)

- ❖ این دارو به صورت کپسول های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرمی در بازار داروئی ایران موجود میباشد .
- ❖ فنوفیبرات برای پائین آوردن سطح تری گلیسرید مصرف میگردد.
- ❖ فنوفیبرات فقط بخشی از برنامه درمانی میباشد و درمان شامل رعایت برنامه غذائی ، انجام فعالیت بدنی منظم و کنترل وزن می باشد .

فنوفیبرات (Trirole) (تریرول)

جهت پائین آوردن تری گلیسرید خون



- ❖ از شما بیمار محترم درخواست میشود در صورت وجود هر یک از موارد زیر پیش از تجویز فنوفیبرات پزشک معالجتان را مطلع فرمائید
- ❖ ابتلا به هپاتیت یا سیروز کبدی ، مصرف داروهای نظیر وارفارین و سیکلوسپورین ، وجود اختلال در عملکرد کلیوی
- ❖ ابتلا به بیماری کیسه صفرا ، بارداری و شیردهی .
- ❖ دارو را طبق دستور پزشک و همراه غذا میل کنید .
- ❖ همانند هر داروی دیگر فنوفیبرات نیز می تواند با عوارضی همراه باشد ولی توجه داشته باشید که بسیاری از بیماران عارضه ای را تجربه نمی کنند و یا در صورت بروز ، خفیف میباشد .



یامن اسمہ دواء و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

داروهای کاهنده

چربی (۲)

کد محتوا: ۵۵۵



<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

روغن ماهی

این دارو به شکل کپسول های یک گرمی ، برای کاهش دادن سطوح بالای تری گلیسرید خون مورد استفاده قرار میگیرد . کپسول را همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف نمائید. قبل از مصرف این فراورده در موارد زیر با پزشک مشورت کنید .

- ۱- وجود هر نوع سابقه حساسیت به این فراورده یا سایر فراورده های ماهی و سایر مواد نظیر ژلاتین ، محافظت کننده ها و رنگ ها
- ۲- در صورت وجود بیماری دیابت ، بیماری کبدی ، پرکاری تیروئید

۳- در صورت بارداری و شیردهی

۴- بیمارانی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنند

۵- بیماران مبتلا به آسم که به آسپرین حساسند .

این دارو ممکن است سبب بروز نفخ و ناراحتی شکم ، تهوع ، آروغ ، اسهال و احساس طعم نامطبوع در دهان شود . قبل از مصرف این دارو ، پزشک را در جریان کلیه داروهای مصرفی خود قرار دهید .

کپسول امگا۳ را همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف نمائید .

تهیه کننده: مریم اقتداری "کارشناس ارشد پرستاری"

منبع: فارماکو لوژی بالینی پرستاری ۲۰۲۰

مشاور علمی: خانم دکتر کریمی فر "فوق تخصص غدد"

طراحی و تدوین: محمود نصرافهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"

بهار ۱۳۹۵

بروز رسانی دفتر آموزش سلامت الزهرا(س) شهرپور ۱۳۹۹



❖ عوارض احتمالی این دارو عبارتند از : سردرد ، درد شکمی ، سوزش سر دل ، تهوع و استفراغ

اگر روزی یکبار آن را مصرف می کنید توصیه میشود با غذای عصر خورده شود . اگر یک نوبت را فراموش کردید ، به مجردی که به یاد آوردید آن را مصرف کنید . اگر تقریباً موقع نوبت بعدی فرا رسیده است نوبت فراموش شده را کنار بگذارید . مقدار دارو را دو برابر نکنید



داروی خود را دور از نور و در دمای اتاق نگهداری نمائید و از قرار دادن آن در آشپزخانه و یا حمام بپرهیزید

