

آمادگی لازم جهت انجام انواع تصویر برداری

عکس رنگی از روده بزرگ


- بیمار برای انجام عکس رنگی نباید یبوست داشته باشد .
- رعایت رژیم غذایی سبک
- استفاده از ملین (خوردن سوپ و مایعات) در روز قبل عکس رنگی الزامی است .
- در روز قبل از انجام گرافی بعد از ناهار چیزی میل نشود .
- عصر روز قبل ۴۰ گرم روغن کرچک میل نموده
- تا ۵ عصر فقط آب میل شود
- صبح روز بعد ناشتا مراجعه شود.

آمادگی جهت انجام یو جی ای (U.G.I) و

- ازوفاگورام (عکسبرداری از بلع و مری با ماده حاجب)
- ناشتا بودن حداقل ۴ ساعت قبل از آزمون الزامیست.

آمادگی جهت انجام عکس برداری (ترانزیت) روده

- ناشتا بودن حداقل ۱۲ ساعت قبل از آزمون الزامیست .



آمادگی لازم جهت انجام گرافی

(IVP) ای وی پی (عکس رنگی از کلیه ها)

- در بیماران مبتلا به دیابت (قند خون) طبق نظر پزشک
- معالجه در صورت مصرف متفورمین ، ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از تزریق عکس رنگی ، داروی متفورمین باید قطع شود (در موارد خاص که کراتینین نرمال باشد قطع متفورمین ۴۸ ساعت بعد کافی است) .
- بیمار برای انجام عکس رنگی نباید یبوست داشته باشد .
- رعایت رژیم غذایی سبک و استفاده از ملین (خوردن سوپ و مایعات) در روز قبل عکس رنگی الزامی است
- در روز قبل از انجام گرافی بعد از ناهار غذای جامد میل نشود .
- عصر روز قبل ۴۰ گرم روغن کرچک میل نموده و بعد از آن فقط آب نوشیده شود .
- آزمایش (BUN/Cr) بی یو ان و کراتینین را سه روز قبل از روز عکس برداری انجام داده و به همراه داشته باشد.
- صبح روز بعد ناشتا مراجعه فرمایید



آمادگی لازم جهت انجام عکس رادیولوژی ستون فقرات کمری

- بیمار شب قبل از مراجعه ساعت ۶ یا ۷ شام سبک میل نموده
- سپس ۱ شیشه روغن کرچک را با مقداری آب لیمو مخلوط کرده می خورد
- چنانچه نمیتواند از روغن کرچک استفاده کند به جای آن از ۶ عدد قرص بیزاکودیل استفاده کرده
- بعد از آن هیچ چیز غیر از آب نمی خورد
- صبح روز بعد ناشتا مراجعه می کند.
- به طور کلی جهت بررسی مهره های کمر، دو تصویر تهیه می شود :
- یکی در وضعیتی که بیمار طاقباز (به پشت) می خوابد



دیگری در وضعیتی که بیمار به پهلو راست یا چپ می خوابد.



- برای بررسی لگن یک تصویر در حالی که بیمار طاقباز خوابیده است تهیه می شود.
- برای بررسی شکم برحسب درخواست پزشک یک تصویر در حالت خوابیده و یک تصویر در حالت ایستاده تهیه می شود.



یاسن اسمہ دواؤ و ذکرہ شفاء



راهنمای بیمار

آمادگی های

انواع تصویر

برداری

کد محتوا: ۳۷۲

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

آمادگی لازم جهت انجام سونوگرافی

برای سونوگرافی شکم و از جمله کبد و مجاری صفراوی ۸ ساعت ناشتا بودن کافی است .

آمادگی لازم جهت انجام سونوگرافی

برای سونوگرافی لگن از جمله مثانه ، پروستات ، رحم ، تخمدانها و حاملگی زیر ۴ ماه پر بودن مثانه لازم است . با توجه به نکات فوق جهت انجام سونوگرافی شکم و لگن و کلیه مجاری ادراری و مثانه ، حتما مثانه با نوشیدن فقط آب و چایی (نه مایعات دیگر مانند شیر ، نوشابه و نوشابه های گازدار) پر شود .



تهیه کننده : فریده نقشینه "کارشناس رادیولوژی"
مشاور علمی : دکتر علی نوروزی "متخصص رادیولوژی"
منبع: مریل 1990
طراحی و تدوین : محمود نصرافهانی "سوپروایزر آموزش سلامت"
بروزرسانی خانم متقی "کارشناس رادیولوژی" دفتر آموزش سلامت
الزهراس (س) خرداد ۱۳۹۹



هنگامیکه پرسنل رادیولوژی اتاق را ترک می کند از شما می خواهد برای چندثانیه نفس خود را حبس کنید و کاملاً بی حرکت باشید. تنفس و تحرک شما می تواند تصویر را محو کند.

لطفاً با پرسنل رادیولوژی همکاری کنید تا آزمون مجدداً تکرار نشود و تصویر تهیه شده دارای ارزش تشخیصی برای پزشک باشد.

آمادگی های لازم جهت انجام سونوگرافی های داپلر رنگی

برای انجام سونو داپلر رنگی عروق کبد (ورید پورت و مزانترو و IVC و طحالی) وعروق کلیوی به ترتیب زیر عمل شود .

بیمار باید :

روز قبل از نوبت انجام ، بعد از صبحانه و ناهار دودعد قرص دایمیتیکون جویدنی بخورد .

عصر روز قبل سوپ رقیق بخورد ،

شام نخورد .

نیم ساعت پس از سوپ ۴۰ گرم روغن کرچک (یک شیشه) میل کند.

شب قبل از خواب ، یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال کند .

صبح ناشتا دودعد قرص دایمیتیکون جویدنی دیگر خورده و مراجعه کند

